


Consultora de Climatología Aplicada
e-mail: cca@ciudad.com.ar - tel/fax: 4722 1251 y 4487 2507

LA TEMPERATURA TAMBIÉN PROTAGONISTA 27/09/07

La importante recuperación de la humedad del suelo, también ha sido acompañada por notables cambios en el patrón térmico.


MARCHAS CON CAMBIOS DRÁSTICOS

El cambio que experimentó el patrón pluvial en los primeros veinte días de septiembre ya lo hemos descripto en otros informes, sin embargo es interesante ilustrar también el significativo vuelco que evidenciaron las temperaturas mínimas dentro de este período. Para ello vamos a mostrar la marcha que tuvo esta variable desde el mes de agosto hasta la actualidad en tres localidades representativas de la región pampeana, comenzando por Santa Rosa en la provincia de LP.




La temperatura mínima media del mes de agosto para esta localidad se ubico tres grados por debajo del valor normal para dicho período, mientras que en lo que va de septiembre se ha experimentado un apartamiento positivo de casi tres grados. A lo largo de agosto los registros superaron solo en forma ocasional los 5°C, con inusual frecuencia de heladas. Se nota un cambio notable en el comienzo de septiembre, siendo esto una anomalía muy destacada, marcándose una tendencia decreciente hacia valores más comunes para la época a partir del 10 de septiembre.

A continuación se presenta la marcha de temperaturas mínimas para la localidad de Junín. Podemos considerar esta localidad como representativa de la zona núcleo del norte de BA.



Al igual que en Santa Rosa, esta localidad evidenció durante Agosto un inusual registro de temperaturas mínimas por debajo de cero, condición a la que se acercó tan solo en una ocasión en el corriente mes, el lunes pasado.

La localidad de Marcos Juárez no escapa a este comportamiento y esto se refleja en su marcha de temperaturas mínimas.



En las tres marchas de temperaturas se hace evidente el rigor con que cerró el invierno. Principalmente las tres localidades registraron una frecuencia de heladas muy alta para lo que es normal durante el mes de agosto, destacándose la cantidad de mínimas por debajo de cero dentro de este período.

Al igual que con las precipitaciones, el ingreso de aire tropical desde los primeros días de septiembre indujo un notable cambio de ambiente. Las dos variables reflejan un vertiginoso cambio estacional, el cual no estaba dentro de las previsiones de mediano plazo.

La última semana de septiembre ha recompuesto los registros térmicos, llevándolos a valores más usuales para la época del año. Durante las próximas jornadas nuevamente se irá fortaleciendo el ambiente cálido y húmedo. Estas condiciones devendrán en precipitaciones que pueden resultar excesivas para el centro de SF y sectores del centro y sur de ER. Durante la primera quincena de octubre aún pueden darse fuertes oscilaciones del patrón térmico. Si bien para el sur de la región pampeana la posibilidad de heladas para este período se inscribe dentro de los parámetros normales, este fenómeno implica un mayor riesgo para las sementeras de trigo de la franja central.