Consultora de Climatología Aplicada
e-mail: cca@ciudad.com.ar - tel/fax: 4722 1251 y 4487 2507

PRONOSTICO RESERVADO **15/01/08**

Mientras que vastas zonas maiceras se debaten por la falta de agua, gran parte de la soja de primera aún mantienen un paso favorable. El comportamiento pluvial de los próximos quince días define las condiciones iniciales de humedad para el período de floración de esta oleaginosa.

RESERVAS MUY DEFICIENTES

Acompañando el magro comportamiento de las precipitaciones de los últimos dos meses, las reservas de humedad muestran niveles que no constituyen ninguna garantía para el exigente período que deben enfrentar los cultivos.

Ante un panorama pluvial como el actual son las reservas de humedad las que salen a sostener el buen estado de los plantíos. Justamente ese es el punto, el balance hídrico de la región pampeana comienza a dar argumentos que consolidan un escenario de riesgo aumentado para el inicio de la etapa de floración de la soja. El maíz ya acusa pérdida de potencial y actualmente se discute cual será el piso al que caiga la producción de este año. Hay consenso en que la pérdida mínima será de dos millones de toneladas. Es decir, el desfavorable entorno climático ha consumido rápidamente el lógico aumento de la producción que establecía el incremento del área sembrada.

Las condiciones actuales y las perspectivas de corto y mediano plazo definen un mercado climático. El mismo se irá modificando en uno u otro sentido al ritmo de las mejoras que pueda ir experimentando el comportamiento de las precipitaciones. A esta altura del año pasado los mercados eran totalmente ajenos a lo que sucedía con el clima en la región pampeana.

El balance hídrico del primer metro de suelo, define eficazmente a nivel regional, las condiciones iniciales de reservas con la que los principales cultivos encaran el crucial período que vamos a transitar. La primera aproximación de las reservas, puede obtenerse teniendo en cuenta como cobertura una pradera de consumo permanente a lo largo de todo el año.

Este primer mapa muestra la compleja situación que atraviesa toda la región pampeana. Con esta cobertura, las mejoras podrían observarse a menor escala, una que pueda acompañar la gran disparidad que han presentado las precipitaciones.

MAÍZ

Si el balance hídrico lo realizamos considerando una cobertura de maíz, la situación se modifica solo por sectores. Esto es debido a que el consumo hídrico de las plantas de maíz es el mismo o incluso superior al de una pastura.

Entre Ríos y las vecindades de SF aparecen muy complicados por la sequía, la cual se extiende por el noreste de BA a sectores del centro de esta provincia. Si bien sobre el sudoeste de BA y el sur de LP el área maicera no es de importancia, el mapa puede considerarse un indicador de las reservas con las que cuenta el girasol. Aunque el mismo es más resistente a la falta de agua, este cultivo evoluciona en forma comprometida en este sector.

Las lluvias de principio de enero aún se reflejan en un mejor nivel de reservas sobre el sudeste de BA, donde muchos lotes se han sembrado más tarde que en la franja central o incluso han rebrotado luego de las heladas de mediados de noviembre. Los departamentos del sudoeste de CB son los que han recibido precipitaciones más copiosas y es normal que en la zona los plantíos evolucionen con algo más de margen.

Considerando este mapa, sería un buen resultado sumar las 22.5 millones de toneladas de la pasada campaña. Si no mejoran las precipitaciones, este objetivo se verá lejano a pesar del aumento del área sembrada.

SOJA

Sin dudas las condiciones meteorológicas que se han sucedido desde finales de diciembre, han quedado lejos de ser las ideales para la evolución de los cultivos de verano. A pesar de esto, la soja aún ostenta niveles de reservas que pueden considerarse adecuados, al menos por el momento.

Los lotes más adelantados comienzan a ingresar en estos días en la etapa de floración. A lo largo de la segunda quincena se irán incorporando otras áreas, sin embargo el grueso de las sementeras tendrán en el mes de febrero su período crítico.

Respecto de lo que se observara en los mapas anteriores, la soja tiene reservas que dentro de la zona principal se mantienen en niveles adecuados. Incluso algunos

sectores reducidos, privilegiados en la oferta de agua, ostentan un paso aún más aliviado.

Mantener este nivel de reservas exige una mejora perentoria en el patrón pluviométrico. El corto plazo presenta pronósticos que sostienen la oferta irregular, aunque posiblemente algo más generalizada y abundante hacia el viernes, fundamentalmente sobre la franja central.

Considerando las reservas actuales y una mejora de las precipitaciones durante la segunda quincena, es posible proyectar un buen ingreso al mes de febrero. Las tendencias a mediano y largo plazo siguen perfilando a las lluvias normales como la perspectiva más optimista, sin embargo no debe sorprender que el patrón pluvial deficitario se mantenga a nivel regional. La irregularidad en la distribución de las precipitaciones seguirá definiendo matices a nivel local y de lote.

CONCLUSIONES

El panorama es muy complejo para maíz. En zonas muy diferenciadas la campaña mostrará rendimientos normales. A nivel regional este cultivo evidenciará pérdidas de potencial. Revertir esta situación exige precipitaciones del orden de 100 mm, las cuales no se prevén para el corto plazo, salvo en forma muy localizada. De no mediar precipitaciones, el girasol puede estar padeciendo una situación similar en los próximos diez días.

La soja parte de condiciones adecuadas, pero sin demasiado margen. También demanda lluvias en forma perentoria para que no se concrete el alto riesgo de sequía que podría imponerse en momentos de floración. La segunda quincena de enero y los primeros días de febrero definirán el paso de esta oleaginosa.

La frecuencia de sistemas frontales es alta. Esto no es demasiado favorable como para que las masas de aire húmedo se extiendan en forma homogénea en la región pampeana. Particularmente, durante los próximos días es posible que ingrese algo más de humedad y se sostenga del centro para el norte de la región pampeana. Esto puede estar definiendo sistemas precipitantes mas copiosos y generalizados para la jornada del viernes.