




Consultora de Climatología Aplicada
e-mail: cca@ciudad.com.ar - tel/fax: 02293-427837 y 011-4487 2507

SITUACIÓN EN USA

A pesar de que en vastos sectores del cinturón maicero sojero de USA subsisten las reservas de humedad excesivas, la evolución de los cultivos es satisfactoria.

PERSISTIÓ EL PATRÓN HÚMEDO

Durante el mes de junio una gran parte de los centrales del medio oeste recibieron entre 100 y 150 milímetros por encima de los valores normales. Si bien durante la segunda quincena del mes los eventos con lluvias copiosas se fueron espaciando, las condiciones meteorológicas continuaron complicando la implantación de soja. En lo que va de julio el patrón húmedo se mantiene aunque en un área más restringida centrada en Illinois y Missouri.




A lo largo del último bimestre se ha sostenido el patrón húmedo promoviendo claras dificultades para las tareas implantación. Por otra parte la variabilidad de las temperaturas también se ha consolidado como una característica muy atípica del verano del norte. Mientras que el mes de junio se resumió con corrimientos positivos con jornadas de calor muy riguroso, durante la primera quincena de julio nuevamente se ha instalado un patrón térmico donde dominan los corrimientos negativos.

Las fuertes oscilaciones térmicas y un patrón pluvial con corrimientos positivos parecen estar afianzados como características climáticas principales para el resto del mes de julio. Es posible que este comportamiento se extienda al mes de agosto.

CLASIFICACIÓN DE HUMEDAD

Las reservas de humedad presentan corrimientos positivos en gran parte de la zona agrícola principal de USA. La clasificación de humedad refleja el comportamiento pluvial del último bimestre.



En el mapa de clasificación de humedad se advierte con facilidad que las reservas se encuentran muy por encima de los valores normales en la mayor parte del corn belt. Solo sobre las altas planicies, las deficiencias pluviales han permitido normalizar los excesos hídricos.

Para julio de 2007, las reservas de humedad sobre el cinturón sojero, se clasificaban mayoritariamente dentro de los valores normales.

Dentro de este contexto y más allá de los recortes de producción que se han generado por las inundaciones de junio, el estado de los cultivos principales es satisfactorio. El USDA informa que el maíz alcanza un 64 por ciento del área en estado bueno a excelente, mientras que la soja ronda el 60 por ciento. Considerando la irregular situación hídrica es razonable suponer que el estado de estos dos cultivos no prospere más allá de estos valores, mucho más si se tiene en cuenta que las previsiones de corto plazo sostienen el patrón húmedo.

PERSPECTIVAS

El fuerte gradiente térmico que se observara durante gran parte de junio entre las altas planicies y el resto de las zonas agrícolas, parece haberse disipado en lo que va de julio. Es muy posible que esto evite la alta frecuencia de eventos caracterizados por lluvias copiosas, sin embargo es poco probable un escenario que evolucione hacia precipitaciones por debajo de los valores normales.

Las altas planicies (las Dakotas, Minnesota) comienzan a padecer la falta de lluvias, sin embargo esta tendencia no afecta al centro del Medio Oeste, ni tampoco al resto de las regiones agrícolas. Es poco probable que se observen zonas extendidas con deficiencias pluviales sobre el centro del corn belt.

Las reservas actuales y los pronósticos de corto plazo garantizan la tendencia que sostiene una entrada al mes de agosto con vastos sectores del Medio Oeste con almacenajes por encima de los valores normales. Por lo tanto, aún considerando un cambio importante en el patrón pluvial, la primera quincena de agosto trascorriría con humedad adecuada para la floración de maíz. Es poco probable un cambio hacia un régimen pluvial deficitario que comprometa seriamente la evolución de la soja. En todo caso las mermas en los rendimientos estarán mayormente vinculadas a los excesos hídricos y a los problemas que estos acarrearán.

Se espera que durante el resto de julio las temperaturas evolucionen de modo de resumirse cercanas a los valores normales, tendencia que posiblemente se consolide en agosto.

En resumen, el escenario más probable para el ingreso al período crítico de la campaña de USA es el que muestra lluvias de normales a abundantes sobre el centro del corn belt, posiblemente mas deficitarias hacia las planicies. El patrón térmico posiblemente sea más variable que el régimen pluvial, aunque con oscilaciones menos extremas que las observadas en mayo (frío) y junio (cálido).