

Consultora de Climatología Aplicada
e-mail: cca@ciudad.com.ar - tel/fax: 011-4722 1251 y 02293-42 7837

CORDOBA ESPERA

Mientras que una buena porción de la zona núcleo ha experimentado recargas significativas en su perfil de suelo, Córdoba aún se debate con deficiencias hídricas que complican el inicio de la campaña gruesa.

SIN CONTINUIDAD

Si bien a lo largo del mes se han observado precipitaciones en la provincia de Córdoba, las mismas quedan lejos de satisfacer las necesidades hídricas de suelos que arrastran importantes deficiencias.

La distribución de las precipitaciones en lo que va del mes, claramente ha favorecido a las provincias de ER, SF y BA. Algunos sistemas precipitantes llegaron a la provincia de CB, llegando recientemente a las zonas agrícolas de Chaco. Sin embargo, las lluvias copiosas no se han hecho presentes salvo en forma puntual en la provincia de CB. Si bien en lo que resta del mes es posible que nuevos eventos dejen precipitaciones en la provincia mediterránea, en el mejor de los casos bastarán para lograr los registros normales, condición que no es suficiente para recomponer plenamente el perfil de humedad.

A medida que se afianza el semestre cálido, la circulación del noreste que favorece el aumento de las precipitaciones sobre el este de la región pampeana, se complementa oportunamente con entrada de humedad de origen amazónico. La provincia de CB generalmente se beneficia con la formación de la baja presión que en el semestre cálido se forma en el NOA. De este modo, la alta presión del Atlántico y la baja presión del NOA, regulan la entrada de humedad en las capas bajas y medias de la atmósfera. Las precipitaciones de la mayor parte de las áreas productivas de la Argentina son muy sensibles a las alteraciones que presentan estos flujos de humedad.


Al presente, podemos decir de manera objetiva que las masas de aire de origen tropical están alcanzando de manera satisfactoria una buena porción de la región pampeana, quedando la franja mediterránea provista solo por sistemas precipitantes menores. Un atraso en el inicio de la temporada de lluvias no sería tan complejo sino se arrastrara un déficit hídrico tan destacado. Las precipitaciones sobre el NOA, recién comienzan a aparecer evidenciando un pobre ingreso de humedad desde los llanos orientales de Bolivia.

Teniendo en cuenta que los cultivos de invierno en la provincia de CB, seguramente experimentarán una fuerte merma en los rendimientos respecto de los valores medios, todas las expectativas están puestas en las siembras de soja y eventualmente de maíces de ciclo corto. Mientras que el sur de SF, ER y todo el norte de BA, ya presentan un nivel de humedad adecuado en el primer metro de suelo, las sementeras de CB aguardan que el mes de octubre cierre algo más húmedo para sumar los milímetros que necesarios para recomponer satisfactoriamente la humedad en la cama

de siembra. Las perspectivas son favorables. Si bien las lluvias no cambiarían drásticamente hacia un patrón mucho más generoso, bastarían como para cumplir este primer objetivo.

ESCENARIOS PARA SOJA

A continuación mostramos los posibles escenarios que podrían presentarse sobre la región pampeana, simulando el balance hídrico bajo distintas condiciones pluviales. Las situaciones resultantes deben considerarse como un ejercicio que genera un indicador de escala regional, posicionando cuales serían las zonas más vulnerables para las siembras o las primeras etapas del cultivo. Se considera balance superficial, los primeros 20 a 30 centímetros del suelo. Se intenta proyectar la viabilidad de las siembras.



De no mediar una situación extrema, el final de octubre y la primera quincena de septiembre, deberían mostrar un afianzamiento de las mejoras pluviales, incluso para la franja oeste. El escenario normal es el que se impone bajo estas circunstancias. Zonas del centro norte de BA y sur de SF, podrían mostrar reservas excesivas hacia mediados de noviembre.

En general, las perspectivas son muy favorables. El escenario seco, no es el más probable. Aún así una buena parte de la zona núcleo ha sumado reservas capaces de hacer frente a una situación semejante, claro está, CB se vería muy complicada.

La demanda de precipitaciones de la provincia de CB para recomponer completamente su perfil de humedad durante los próximos quince días es poco probable de lograr. La oferta de agua irá configurando un escenario propicio para las siembras aunque mas dificultoso que la franja este de la zona núcleo. Es posible entonces, que muchos productores cordobeses y los santafesinos vecinos al departamento de Marcos Juárez, deban plantearse corrimientos en la fecha habitual de siembra. El pronóstico de corto plazo tenderá a dirimir esta complicación. Para el resto de la zona núcleo la situación prevista es holgada.