


Consultora de Climatología Aplicada
e-mail: cca@ciudad.com.ar - tel/fax: 011-4722 1251 y 02293-42 7837

ESTADO DE LOS CULTIVOS

Se muestra el resultado de los balances hídricos para distintas coberturas. A pesar de la falta de agua y su distribución irregular la soja se posiciona favorablemente.

PRADERA

La primera cobertura que analizamos es la pastura. La misma se supone con consumo parejo a lo largo de todo el año. Es la que refleja con mejor memoria la falta de precipitaciones que hubo a lo largo de todo el año.




Este mapa puede considerarse representativo para el trigo en el sudeste. Posiblemente este cultivo no cerró tan exigido, sin embargo durante la floración y fundamentalmente desde la segunda quincena de noviembre, las reservas se consumieron en forma vertiginosa, más aún si consideramos la mínima oferta de agua que se observó en la zona.

MAIZ

En orden de padecimiento del déficit hídrico, el maíz le sigue a la pradera. El nivel de reservas decrece en la franja central de oeste a este. La provincia de ER, es la que está llevando la peor parte. En muchos lotes de esta provincia ya se han comenzado a

picar las plantas para consumo ganadero o hacer silos. El centro de SF y parte del sur de esta provincia tampoco ha tenido un buen paso hídrico para este cultivo, situación que se extiende a sectores del centro este y noreste de CB. El norte de BA lleva un paso ajustado y puede ser aliviado oportunamente por precipitaciones que llegarían entre domingo y lunes.




Las reservas excesivas que se observan en SL, en sectores de LP y sudoeste de BA, son producto de algunas lluvias copiosas observadas en las últimas horas. Recordamos que el sistema frontal se ha mantenido prácticamente estacionario durante las últimas tres jornadas en esta línea. Al norte de esta posición han prevalecido condiciones meteorológicas estables, con altas temperaturas y cielos mayormente despejados. Queda bien claro en el mapa que las reservas para maíz son muy buenas en gran parte del centro sur de CB, disminuyendo hacia la provincia de SF. En esta provincia las reservas para este cultivo decrecen rápidamente de Venado Tuero hacia Rosario. La falta de agua se hace sentir en forma más homogénea del lado entrerriano, donde si no llegan precipitaciones en forma perentoria, los rindes serán muy pobres y puede generalizarse el acopio de este cultivo con destino a forraje.

SOJA

A pesar de todo, la soja sigue siendo el cultivo que resume las mejores expectativas para salvar un año muy difícil. Sobre todos aquellos cultivares sembrados con buena humedad, han logrado superar de manera razonable el dispar comportamiento pluvial.

Si bien durante noviembre la soja sembrada temprano padeció la falta de agua, los cultivares se recuperaron con las lluvias de finales de mes, principalmente en la zona núcleo. Actualmente el estado de humedad para este cultivo es satisfactorio. En el sur

entrerriano, posiblemente el nivel de reservas esté sobreestimado. Lo mismo es aplicable al norte de SF y el sudeste de BA.



PRONÓSTICO

Las lluvias que puede estar dejando el frente estacionario sobre el oeste y sudeste de BA y gran parte de CB, recién lograrían avanzar hacia la zona núcleo durante el domingo. Se espera un comportamiento adecuado de las precipitaciones para entonces, con proyección hacia la jornada del lunes. Los acumulados serían mas importantes sobre el oeste y el centro de la zona núcleo perdiendo eficiencia hacia al provincia de ER, donde igualmente se observarían precipitaciones.

De validarse este pronóstico se sostendría el buen nivel de humedad en gran parte de la zona núcleo, ajustándose hacia ER.

La última semana de diciembre también sería más húmeda pero el patrón pluvial no se recuperará en forma generalizada.