Consultora de Climatología Aplicada
e-mail: cca@ciudad.com.ar - tel/fax: 011-4722 1251 y 02293-42 7837

BUSCANDO NORMALIZARSE
27/02/09

Desde principios de este mes las mejoras de pluviales en la franja central aliviaron el último tramo de la campaña. Por el momento las perspectivas quitan al clima como factor de tensión.

LA MEJORA DE FEBRERO

Si bien la recuperación del patrón pluvial no alcanzó a toda la región pampeana, las reservas de agua útil de finales de febrero se encuentran sustancialmente mejoradas respecto de los últimos días de enero. Claro está, la zona núcleo sojera es la que se ha llevado la mejor parte, mientras que gran parte del sur de BA y LP, padecen aun la sequía, solo con interrupciones temporarias.

Actualmente la distribución de humedad que presenta la región pampera se ajusta más a lo esperado. Es decir, habitualmente durante la campaña gruesa quedan zonas desprovistas de lluvias que caen en sequía, sin embargo es muy difícil encontrar antecedentes cercanos para lo ocurrido durante esta campaña durante el bimestre diciembre enero, período en el que la totalidad de las provincias de ER, SF, este de CB, LP, BA y la zona agrícola del NEA, sufrieron distintos grados de sequía. La vastedad con que este evento se hizo presente, fue sin duda su principal característica. En este sentido decimos que la configuración actual de reservas es más habitual, sin pasar por alto el padecimiento de las áreas agrícolas al sur del Salado bonaerense.

En muchas ocasiones hemos mostrado mapas que permiten establecer las necesidades pluviales capaces de mantener o alcanzar reservas adecuadas. Allá por finales de enero, las lluvias necesarias para quebrar la seca de manera contundente se ubicaban en valores del orden de los 150 milímetros. Los primeros días de febrero comenzaron a dejar lluvias de peso que se consolidaron a lo largo del mes con tres o cuatro eventos significativos. En muchas zonas de ER, SF, este de CB y norte de BA, estos registros han sido alcanzados o superados. Esto permitió salir del estado de sequía y encarar el último tramo de campaña sin deficiencias hídricas.

Este favorable cambio, excluye a la mayor parte del sur de la región pampeana. Particularmente esta región puede recibir precipitaciones a partir de la jornada del domingo, sin embargo es muy importante remarcar que este sector plantea una demanda de precipitaciones similar a la que exigía la zona núcleo allá por finales de enero. Solo zonas reducidas y excepcionales como las vecindades de Daireaux, han recibido lluvias copiosas.

De acuerdo a lo expresado, es interesante observar como se han recuperado las reservas de humedad desde finales de enero. Considerando los almacenajes luego de las lluvias del domingo 22 de febrero y las existentes para la última jornada de enero,

puede evaluarse la diferencia y de esta manera reconocer donde se han producido las mayores recargas.



Como es lógico las mayores recargas se concentran en ER, SF y el norte de BA. Hay zonas del centro de ER, que no han recibido lluvias demasiado importantes y que aún padecen cierto grado de sequía o deficiencias hídricas, pero la situación general de esta provincia esta muy mejorada. Lo mismo puede decirse para SF y el extremo norte de BA. En particular las zonas frutícolas del corredor BA Rosario han experimentado una oportuna y destacada recomposición de humedad.

La provincia de CB, fundamentalmente el oeste y el sur se ha mantenido mas estable, con un nivel de reservas mas adecuado y sostenido a lo largo de la campaña, lo cual seguramente se traducirá en rendimientos más elevados. Por el contrario, el mapa muestra con mucha claridad como las recargas apenas se hicieron evidentes en el norte de LP y noroeste de BA o incluso retrocedieron al sur del Salado bonaerense. Es decir a lo largo de febrero las zonas agrícolas y ganaderas del centro sur de BA y LP, se han mantenido en sequía o con mejoras temporarias superficiales.

Como mencionamos anteriormente, los esquivos sistemas precipitantes para el sur de la región pampeana, comenzarían a llegar durante los primeros días de marzo. A pesar de matices de escala local algo mejor posicionados con sus almacenajes, todo el sur de la región pampeana requiere este cambio pluvial con urgencia.