




Consultora de Climatología Aplicada
e-mail: cca@ciudad.com.ar - tel/fax: 011-4722 1251 y 02293-42 7837

VERANOS OPUESTOS 21/05/10

El comportamiento extremo de las reservas de humedad en las dos recientes campañas resumido en dos mapas

ANOMALÍAS MUY DESTACADAS

Las fuertes anomalías observadas en los dos últimos semestres cálidos, fueron máximas en el trimestre de verano. La clasificación de humedad del verano 08/09 y su comparación con la de este último se muestran en la siguiente figura.



El periodo estival a quedado caracterizado por clasificaciones antagónicas. El verano 08/09, tuvo una importante recuperación de las reservas en febrero en sectores de la franja central, sin embargo la misma no bastó para mitigar el daño producido por el comportamiento climático de los dos meses previos. Por su parte, este último verano las reservas presentan un promedio que al compararlas con los valores normales muestran un fuerte corrimiento positivo. La soja y el maíz se han beneficiado con este comportamiento, con enfermedades de fin de ciclo e la soja que quitaron rinde por su

gran generalización. El girasol fue el más perjudicado por la sobreabundancia de humedad, resultando en una cosecha muy pobre.

Claramente estos mapas ilustran las consecuencias que la variabilidad climática esta imponiendo al desarrollo de las culturas en una de las zonas agrícolas más importantes del mundo.