




Consultora de Climatología Aplicada
e-mail: cca@ciudad.com.ar - tel/fax: 011-4722 1251 y 02293-42 7837

MEJORAS QUE NO ALCANZAN **25/06/10**

A pesar de la mejora pluvial en algunos sectores del sudoeste, las siembras son aún de alto riesgo.


RECUPERACIÓN PARCIAL EN SUPERFICIE

En lo que va del mes de junio las lluvias nuevamente y de acuerdo a lo climático, tendieron a recostarse sobre el este. Sin embargo, el sur de LP y los partidos del extremo sudoeste de BA al sur de Ventania, acumularon precipitaciones que alientan alguna posibilidad para concretar algunas implantaciones. Si el comportamiento pluvial del otoño hubiese sido el normal, las recientes precipitaciones estarían garantizando la evolución de los cultivos de invierno, sin embargo éstas han servido para reconstituir parcialmente las reservas de superficie. Observemos cual era el resultado del balance hídrico superficial a principios de mes.



A principios de mes quedaban definidos claramente los problemas hídricos que enfrentaba la actual campaña triguera. Mientras los excesos dominaban el este, una vasta franja mediterránea de reservas muy pobres se afianzaba minimizando las

posibilidades de siembra. Entre el 13 y el 22 del corriente mes se presentó un extendido período húmedo que si bien no dejó lluvias abundantes sobre el sector más necesitado, permitió incorporar algunos milímetros a los primeros centímetros de suelo. Sobre el sur de LP y las vecindades del extremo sudoeste de BA, las lluvias se ubicaron entre 18 y 25 milímetros, acumulados que pueden apreciarse como estadísticamente normales para la época. Como resultado de estas precipitaciones un sector del sudoeste ha mejorado, esto se refleja la actualización del balance hídrico superficial.



Dos aspectos son destacables en este mapa. Por un lado la mejora en el extremo sudoeste de la región pampeana. La misma no es importante sobre las vecindades de Pigué, Puan, Bordenave y los partidos del oeste de BA que limitan con LP. Es muy complicado el panorama para el sector que superficialmente mantiene las reservas en la categoría sequía. Por otra parte se ha observado un importante retroceso de los excesos hídricos en SF, ER y noreste de BA. Las reservas siguen siendo muy holgadas sobre la cuenca baja del Salado y el centro sudeste de la provincia de BA, donde en general los suelos se mantienen cercanos a la saturación. A pesar de que estas condiciones hídricas no son ideales para las siembras, sobre este sector aún el margen de tiempo para esta tarea es amplio.

Fuera de esta situación coyuntural, y como hemos mencionado en otros informes, las áreas aptas para las siembras están definidas. Podría sostenerse la mejora en las zonas que recientemente incorporaron algunos milímetros en superficie, pero el margen de humedad sigue marcando un riesgo importante sabiendo que climáticamente la zona no recibe más que unos 30 milímetros en el próximo bimestre.