

### BOLSA DE CEREALES DE CÓRDOBA Y CÁMARA DE CEREALES Y AFINES DE CÓRDOBA TRIBUNAL ARBITRAL

# **INFORME ESPECIAL DE SALIDA DE CAMPO 20 y 21 de Noviembre del 2013**






**D.I.A.**DEPARTAMENTO DE INFORMACIÓN AGROECONÓMICA



## Relevamiento de campo. Norte de Córdoba. 20 y 21 de Noviembre de 2013

En el presente informe se describen las situaciones de los cultivos de Trigo y Garbanzo observados en los Dptos. Colón, Totoral, Tulumba, Río Seco y Río Primero.



En la zona relevada, el cultivo de trigo representa el 3,4 % de la producción total de trigo en Córdoba, siendo Río Primero el departamento con mayor producción.

La producción total de garbanzo en Córdoba, se concentra en los departamentos de Tulumba, Colón, Río Primero y Totoral, representando estos el 94 % de la producción provincial.

Cuadro N°1: participación de los cultivos de trigo en la zona relevada.

Departamentos	Producción estimada (Tns.) 2013/2014	Participación en relación al total provincial (%)
Río Seco	0	0
Tulumba	2.347	0.25
Totoral	6.333	0.7
Colón	6.637	0.7
Río Primero	16.338	1.8
Total	31.655	3.4
Prov. Córdoba	927.237	100

Fuente: Elaboración propia en base a datos generados por el D.I.A. BCCBA




Cuadro N°2: participación del cultivo de garbanzo en la zona relevada.

Departamentos		Participación en relación al total provincial
	2013/2014	(%)
Río Seco	0	0
Tulumba	1.075	3
Colón	4.098	11
Río Primero	9.547	25
Totoral	21.793	56
Total	36.513	94
Prov. Córdoba	38.784	100

Fuente: Elaboración propia en base a datos generados por el D.I.A. BCCBA

### Evolución de las precipitaciones

Las reducidas precipitaciones ocurridas en el período crítico de los cultivos invernales impactaron negativamente afectando el estado general de los mismos. Por lo que los rendimientos de trigo en secano esperados en la zona, según la red de colaboradores del D.I.A .de la Bolsa de Cereales de Córdoba, no superarán los 15 qq/ha.



Fuente: Sistema de Precipitaciones - BCCBA

#### Situación de los cultivos de Trigo y Garbanzo.

El estado general de los cultivos en secano es de regular a malo, mientras que bajo riego el estado es muy bueno. Se pudo observar que la mayor proporción de la superficie bajo riego está destinada al garbanzo, siendo esto constatado con la red de colaboradores del D.I.A. de la BCCBA que informaron un 59% de la superficie bajo riego.



Trigo en madurez de cosecha, secano. Estado general bueno. No se observaron plagas y enfermedades



Foto tomada el 20/11/2013 a 9km al norte de la localidad de Estación Juárez Celman. Fuente: BCCBA

Trigo bajo riego en estado de madurez fisiológica. Estado general muy bueno. Cobertura de plantas uniforme. En cuanto al estado sanitario del cultivo, no se observaron enfermedades. Según la red de colaboradores del D.I.A, el rendimiento promedio estimado del trigo bajo riego en la zona es de 39 qq/ha.



Garbanzo bajo riego en estado de madurez de cosecha. Estado general muy bueno. Cobertura de plantas uniforme. En cuanto al estado sanitario del cultivo, no se observaron enfermedades.









Soja en estado de V2. Implantación uniforme. En cuanto al estado sanitario del cultivo, no se observaron enfermedades.



Foto tomada el 20/11/2013 a 8 km al NE de la localidad de Estación General Paz. Fuente: BCCBA

Maíz con muy buena implantación. Estado fenológico en 4 hojas desplegadas. No se observaron plagas ni enfermedades.



Foto tomada el 20/11/2013 a 7 km al SO de la localidad de Luca. Fuente: BCCBA

Quínoa bajo riego en etapa reproductiva.

Foto tomada el 20/11/2013 a 1km al Norte de la localidad de Monte del Rosario. Fuente: BCCBA



Departamento de Información Agroeconómica Bolsa de Cereales de Córdoba.

