


Pese a que faltó lluvia a comienzos del mes de diciembre, los cultivos estivales presentan buen estado general

Informe N° 92-Segunda quincena de diciembre

La escasez de lluvias ocurrida durante el mes de diciembre para la provincia de Córdoba, muy distante de los 101 mm habituales para dicho mes, ponía en riesgo el estado general de los cultivos de la corriente campaña estival. Las precipitaciones ocurridas durante el fin de semana del 24 y 25 diciembre, lograron revertir la situación.

Situación climática




Con escasos milímetros precipitados durante los primeros 20 días del mes de diciembre, lejos de los 101 mm de promedio histórico (2007-2016) para dicho mes en la provincia de Córdoba, la situación de disponibilidad de agua para los cultivos de la campaña estival se volvía cada vez más crítica. En el siguiente gráfico, adaptado de la Oficina de Riego Agropecuario, puede observarse como era el estado de las reservas hídricas en el suelo al 18 de diciembre, mostrando en casi todo el territorio provincial la falta de agua o con reservas de regulares a escasas.



Fuente: Oficina de Riesgo Agropecuario


Las escasas lluvias ocurridas durante la primera quincena de diciembre no lograban cubrir las necesidades hídricas de los cultivos, sin embargo, las precipitaciones que tuvieron lugar durante el fin de semana del 24 y 25 de diciembre, mejoraron sustancialmente esta situación, registrándose un promedio de 65 mm caídos durante esos días. Las mayores precipitaciones se dieron en los departamentos Pte. Roque Saenz Peña (141 mm), San Justo (112 mm) y Unión (110 mm), mientras que los menores registros se dieron en Río Seco (15 mm) y San Alberto (15 mm). Cabe destacar que en algunas localidades como Laboulaye (194mm), San Antonio de Litin (140 mm), La Cesira (198 mm) y Jovita (156 mm), se registraron cuantiosas precipitaciones, que sumado a la condición de napas freáticas altas, desencadenaron nuevas inundaciones en las zonas de las localidades mencionadas.

También se reportaron altas temperaturas, que colaboraron con aumentar los niveles de evapotranspiración del cultivo. Como puede verse en el siguiente gráfico, las temperaturas máximas medias del periodo superaron los 30°C en todo el territorio de la provincia de Córdoba.



CONSEJO N92: PESE A QUE FALTÓ DE LLUVIA A COMIENZOS DEL MES DE DICIEMBRE, LOS CULTIVOS ESTIVALES PRESENTAN BUEN ESTADO GENERAL

En cuanto a los eventos meteorológicos preocupantes a la siembra de estivales, nuestra Red de Colaboradores D.I.A nos reportó que lo más relevantes son sequías, granizo y temperaturas extremas. El siguiente mapa muestra por zona la variable de mayor relevancia.




Fuente: Departamento de Información Agroeconómica- Bolsa de Cereales de Córdoba

Situación de los cultivos


Soja

A lo largo de la provincia, el cultivo de soja de la campaña 2016/17 se encuentra atravesando el estado vegetativo. . En cuanto al estado general, un 86% del área presenta condiciones Buena a Muy Buena y apenas un 8% del total muestra un estado Regular, debiéndose principalmente al cuadro de sequía que atravesó la provincia durante la primera quincena del corriente mes.

Estado fenológico de la Soja (Campaña 2016/17)- Segunda quincena de diciembre



Estado general de la Soja (Campaña 2016/17)-Segunda quincena de diciembre




Fuente: Departamento de Información Agroeconómica- Bolsa de Cereales de Córdoba

En cuanto a plagas en el cultivo, se reportaron ataques de incidencia baja del complejo Oruga Cortadora (*Agrotis sp.*, *Feltia sp.* y *Peridroma sp.*), Oruga Bolillera (*Helicoverpa gelotopon*), Chinche verde (*Nezara viridula*), Arañuela roja (*Tetranychus urticae*) y Oruga medidora (*Rachiplusia un*). El único departamento provincial que no acusó incidencia de plagas aún fue Tulumba. Se reportó también presencia de malezas resistentes de difícil control como Yuyo colorado (*Amaranthus quitensis*) y Rama negra (*Conyza bonariensis*).


Maíz

Los maíces tempranos de la provincia, sembrados durante fines de octubre y comienzo de noviembre, se encuentran en su mayoría, en los estadios vegetativos más avanzados, mientras que un 25% está entrando en fase reproductiva (Maíces en los departamentos de Juárez Celman, Marcos Juárez, San Justo y Unión). En lo que respecta al estado general del cultivo, el mismo se encuentra, mayoritariamente, entre un estado Muy bueno (52%) y Bueno (35%), siendo el porcentaje de maíz que está en mal estado prácticamente despreciable, apenas un 0,16%

Estado Fenológico del Maíz (Campaña 2016/17)-Segunda quincena de diciembre



Estado general del Maíz (Campaña 2016/17)-Segunda quincena de diciembre




Fuente: Departamento de Información Agroeconómica- Bolsa de Cereales de Córdoba

Los departamentos del norte provincial (Río Seco y Tulumba), como así también los del sur (General Roca y General San Martín), no reportaron en éste relevamiento la presencia de plagas, malezas de difícil control ni enfermedades. No así los departamentos del centro, donde se expuso la presencia de plagas como Chinche de los cuernitos (*Dichelops sp.*) y Roya común del maíz (*Puccinia sorghi*), como así también malezas resistentes donde se destacan Yuyo colorado (*Amaranthus quitensis*), Rama negra (*Conyza bonariensis*) y *Elusine sp.*, todas con una incidencia de media a alta.


Maní

El cultivo de maní se encuentra preponderantemente surcando su estadios vegetativos intermedios, entre V2 y V5. No se reportaron plagas, malezas ni enfermedades a lo largo de la zona manisera cordobesa.

Estado fenológico del Maní (Campaña 2016/17)- Segunda quincena de diciembre



Estado general del Maní (Campaña 2016/17)-Segunda quincena de diciembre




Fuente: Departamento de Información Agroeconómica- Bolsa de Cereales de Córdoba


Sorgo

El 78% del sorgo implantado se encuentra en periodo vegetativo, mientras que el 22% restante está comenzando el estado reproductivo. En cuanto al estado general, no es la excepción al resto de los cultivos estivales, la falta de lluvia posiciona la mayoría de la superficie de este cultivo en estado general bueno. No se reportaron plagas, malezas ni enfermedades en los lotes.

Estado fenológico del Sorgo (Campaña 2016/17)-Segunda quincena de diciembre



Estado general del cultivo de sorgo (Campaña 2016/17)- Segunda quincena de diciembre




Fuente: Departamento de Información Agroeconómica- Bolsa de Cereales de Córdoba


Girasol

El 50% de los girasoles cordobeses se encamina al comienzo de la etapa reproductiva, seguidamente por un 38% que se encuentra en los estadios vegetativos más avanzados (V5 en adelante). Respecto al estado general, se los puede encontrar en el lote en un muy buen estado (52%). Como única incidencia de plaga, se reportaron casos leves de Bicho bolita (*Oniscidea sp.*).

Estado fenológico del Girasol (Campaña 2016/17)-Segunda quincena de diciembre



Estado general del Girasol (Campaña 2016/17)-Segunda quincena de diciembre



Fuente: Departamento de Información Agroeconómica- Bolsa de Cereales de Córdoba

El presente informe fue desarrollado gracias a la participación de Colaboradores referentes en toda la provincia, que aportaron sus datos zonales durante el relevamiento realizado por la Bolsa de Cereales de Córdoba en la segunda quincena de diciembre de 2016.

Permitida la reproducción total o parcial del presente informe citando la fuente.

DPTO. INFORMACIÓN AGROECONÓMICA



www.bccba.com.ar

54 351 4229637 - 4253716 Av. Francisco Ortiz de Ocampo 317. B° Gral. Paz
X5000FND Córdoba, Argentina. GPS: S 31.41414487° O 64.173740°