DEPARTAMENTO DE
INFORMACIÓN AGRONÓMICA

BCCBA
Bolsa de Cereales de Córdoba



INFORME AGRONÓMICO


Noviembre 2026



Córdoba: mejoran las perspectivas de los cultivos invernales pese al atraso de la cosecha


Relevamiento del 2 al 10 de noviembre

El relevamiento de noviembre elevó la producción proyectada de trigo a 4,25 millones de toneladas, unas 100 mil más que en octubre, pese al ajuste de la superficie cosechable. En garbanzo también aumentó, hasta 70 mil toneladas. Con la cosecha prácticamente sin comenzar, cerca del 90 % del trigo y del garbanzo se mantenía en condiciones favorables, aunque el ciclo del trigo continuaba atrasado. Las menores temperaturas de octubre contribuyeron a prolongarlo, mientras que la baja disponibilidad de luz durante el llenado es un factor cuyo impacto podrá evaluarse con el avance de la cosecha. El granizo provocó pérdidas localizadas sin modificar el escenario provincial.




La campaña invernal 2026/27 transitaba durante noviembre sus etapas finales en Córdoba, con expectativas productivas que continuaban siendo favorables. En trigo, la actualización del relevamiento elevó la proyección de producción en unas 100 mil toneladas respecto de octubre, impulsada por una mejora en los rendimientos que compensó el ajuste registrado en la superficie cosechable. En garbanzo también aumentaron las expectativas productivas, con una suba cercana a 4,4 mil toneladas respecto del relevamiento anterior, explicada principalmente por una mejora en los rendimientos estimados. Al momento del relevamiento, la cosecha permanecía prácticamente sin comenzar en ambos cultivos; en trigo, el avance rondaba el 1 % provincial y se ubicaba por debajo del observado a igual fecha de la campaña anterior y del promedio histórico.

Pese al escaso avance de cosecha reportado por los colaboradores, cerca del 89 % del trigo mantenía una condición entre buena, muy buena y excelente. Al mismo tiempo, el ciclo del cultivo continuaba atrasado: aproximadamente el 72 % de los lotes todavía atravesaba el llenado de granos, con 19 % en grano lechoso y 53 % en grano pastoso, mientras que solo el 28 % había alcanzado estadios de madurez o cariopse duro.




Elaboración del DIA-BCCBA a partir de la Red de Colaboradores.

Durante octubre, las temperaturas medias del aire se ubicaron por debajo de los valores históricos en gran parte de Córdoba. En comparación con el promedio climatológico 1991–2020, utilizado como período de referencia, durante octubre de 2026 los registros se situaron aproximadamente entre 2 y 5 °C por debajo de los valores habituales, según la región. Estas condiciones habrían reducido la acumulación térmica durante las etapas finales del trigo, prolongando el ciclo y contribuyendo a una llegada más tardía a madurez, en línea con el bajo avance de cosecha observado al momento del relevamiento. Los colaboradores reportaron efectos principalmente leves a moderados asociados a las bajas temperaturas, con daños más marcados en situaciones puntuales, por lo que a escala provincial el impacto se habría manifestado principalmente como un retraso del ciclo y no como una pérdida generalizada del potencial productivo.



Elaboración del DIA-BCCBA. Temperatura media del aire (°C) octubre 2026 vs normal (promedio histórico elaborado mediante datos de reanálisis).

A las menores temperaturas registradas durante octubre se sumó una reducida disponibilidad de luz solar durante buena parte del mes. Los productos decádicos del Servicio Meteorológico Nacional muestran valores bajos de heliofanía efectiva sobre Córdoba principalmente durante la primera y segunda década, con una recuperación hacia los últimos días de octubre. Esta condición coincidió con etapas de llenado de granos en una proporción importante de los lotes de trigo y también fue señalada por la red de colaboradores DIA como un posible condicionante del rendimiento. Una menor disponibilidad de luz durante este período puede limitar la generación de fotoasimilados y, en consecuencia, afectar el peso final de los granos. Su incidencia sobre los rendimientos podrá evaluarse con mayor precisión a medida que avance la cosecha.



Heliofanía efectiva (h) del mes de octubre 2026, tomado del SMN-Servicios Agroclimáticos.


Entre los eventos adversos registrados durante el último tramo del ciclo, el granizo se destacó como la principal causa asociada a pérdidas de superficie en trigo. Los reportes se concentraron principalmente en sectores del centro y este provincial, con mayor recurrencia en los departamentos Río Segundo, San Justo y Río Primero. Si bien los daños fueron localizados y no modificaron el buen escenario productivo a escala provincial, en algunas localidades se informaron pérdidas importantes de superficie, con valores que alcanzaron entre 20 y 30 % en los casos más afectados.

DIA DPTO. INFORMACIÓN AGRONÓMICA BCCBA

BCCBA Bolsa de Cereales de Córdoba

Localidades con pérdidas asociadas a granizo en trigo

Córdoba – Noviembre 2026



Mayores pérdidas reportadas

1.	Oncativo	30 %
2.	Luque	25 %
3.	Las Varillas	20 %
4.	Montecristo	20 %
5.	Calchín	15 %
6.	Arroyito	12 %

Máx. superficie totalmente perdida reportada

- < 5 %
- 5 a <10 %
- 10 a <20 %
- ≥ 20 %


Fuente: Red de Colaboradores DIA – BCCBA.
Para localidades con más de una respuesta se representa el máximo porcentaje de superficie totalmente perdida informado entre los reportes que mencionaron granizo. Los puntos indican localidades con pérdidas reportadas y no representan la extensión geográfica total del evento.

Elaboración del DIA-BCCBA a partir de la Red de Colaboradores.

En cuanto al estado sanitario, los principales reportes en trigo correspondieron a roya anaranjada (*Puccinia triticina*), roya amarilla (*Puccinia striiformis*) y mancha amarilla (*Pyrenophora tritici-repentis*), en general con incidencias bajas a medias y con tratamientos realizados en distintos lotes. También se registraron casos puntuales de fusariosis de la espiga (*Fusarium* spp.), con situaciones de mayor incidencia en algunas localidades, aunque sin evidencias de una problemática generalizada a escala provincial. Con el cultivo próximo a cosecha, la evolución de estos focos y su posible incidencia sobre la calidad del grano constituyen aspectos a seguir en los próximos relevamientos.

En garbanzo, las expectativas productivas también mejoraron respecto de octubre, mientras que la mayor parte de los lotes avanzaba hacia madurez. También se reportaron pérdidas puntuales de superficie asociadas a granizo en localidades de los departamentos Totoral, Río Primero y Colón, con máximos del 10 % en Piquillín y Candelaria Sur. El estado general continuó siendo favorable y, desde el punto de vista sanitario, predominó la rabia (*Ascochyta rabiei*), junto con casos puntuales de fusariosis (*Fusarium* spp.) y otras enfermedades de suelo, con mayor presión en algunos planteos bajo riego.

PERSPECTIVAS CLIMÁTICAS



Pronóstico de precipitación y temperaturas, consenso NOVIEMBRE-DICIEMBRE-ENERO 2026/27 (tomado del SMN).

Para el trimestre noviembre-diciembre-enero 2026/27, el pronóstico climático del Servicio Meteorológico Nacional indica para Córdoba una mayor probabilidad de precipitaciones superiores a lo normal y temperaturas inferiores a lo normal. En el tramo final de los cultivos invernales, estas condiciones podrían favorecer la disponibilidad hídrica, aunque períodos húmedos y temperaturas más bajas también podrían ralentizar el secado de los lotes y condicionar el ritmo de cosecha.

La campaña en imágenes



Imágenes aportadas por la red de colaboradores DIA.

Permitida la reproducción total o parcial del presente informe citando la fuente.

DIA DEPARTAMENTO DE INFORMACIÓN AGRONÓMICA

BCCBA Bolsa de Cereales de Córdoba

CONSULTAS

bccba.dia@bccba.org.ar | +54 0351 4214164 – 4229637 Int. 1111