INFORME AGROECONÓMICO DE LA BOLSA DE CEREALES DE CÓRDOBA

Avance de cosecha y rendimientos estimados Cultivos primavera-estivales 2006/2007 (II). Intención de siembra de Trigo

Relevamiento del 11 Abril al 4 de mayo de 2007

En el continuo proceso de crecimiento del Sistema de Información Agroeconómica de la Bolsa de Cereales de Córdoba, incorporamos a partir de este tercer informe a los departamentos del sur provincial: “Presidente Roque Saénz Peña” y “General Roca” con los que totalizamos once departamentos provinciales que aportan aproximadamente un 90 por ciento del total de producción provincial.

Reiteramos nuestro agradecimiento a todos aquellos que participan como colaboradores informantes del sistema en los diferentes sectores de nuestra provincia, y damos la bienvenida a los nuevos colaboradores.

GENERALIDADES DEL TERRITORIO PROVINCIAL

Tal como se anticipara en el anterior informe, las precipitaciones previas y durante la cosecha desencadenaron diversas situaciones de importancia: Los caminos internos de los campos, al igual que los públicos complicaron la logística para el traslado de las maquinarias y de la cosecha, obligando en algunos casos a guardar gran parte de los granos cosechados en silos bolsas, aún con niveles de humedad poco adecuados y/o muy riesgosos.

Es oportuno ahora recordar las recomendaciones de INTA PRECOP para almacenamiento de granos en bolsas plásticas, que establece en soja un máximo de 14% de humedad para un almacenamiento de bajo riesgo de hasta seis meses. De acuerdo con esta guía, también podría almacenarse hasta por dos meses y con bajo riesgo soja con humedades entre 14-16%. Ésta última fue la situación más frecuente en los almacenamientos informados en este reporte.

Aunque las precipitaciones durante el ciclo del cultivo permitieron obtener mejores rendimientos en términos generales, parte del mismo se vio luego perdido por la imposibilidad de cosecha o por la disminución de la calidad obtenida, reflejada principalmente en soja con granos arrugados, manchados, podridos, partidos y algo de presencia de granos verdes. No solo la oleaginosa tuvo problemas; en maíz y sorgo algunos reportes comentaron el brotado en planta (aún no cosechada). En maní, algunos lotes, particularmente los de zonas de suelos menos arenosos, la cosecha transportó junto con las cajas mayor cantidad de tierra.

El maíz debió esperar la disponibilidad de cosechadoras, y luego de los temporales esta espera desencadenó el brotado dentro de las espigas, deteriorando de manera importante la calidad de los granos.

En los maíces de segunda, que se encuentran finalizando el ciclo, *existen riesgos de heladas tempranas que pueden afectar la calidad del grano a cosechar.*

Con las últimas precipitaciones los perfiles de suelo quedaron con muy buenos aportes de humedad en casi toda la provincia, con condiciones óptimas para la próxima siembra de trigo. Sin embargo los productores retardarán esta decisión incorporando en el análisis la necesaria utilización de fertilizantes (que tienen precios en alza, particularmente los fosforados) y el control de precio de venta del cereal que ejerce el gobierno.

Varias fuentes confirman que desde el punto de vista productivo y económico, el trigo es la alternativa menos ventajosa de los esquemas de producción, teniendo en cuenta que según la zona, el cultivo se produce en áreas marginales con importante riesgo agro climático.

SOJA Y MAÍZ EN CÓRDOBA. Mayo 2007

	SOJA 1°	SOJA 2°	MAÍZ 1°	MAIZ 2°
Departamento	Avance de Cosecha/ Rendimiento		Avance de Cosecha/ Rendimiento	
Marcos Juarez	50-95% 30-38 qq/ha	1-30% 25-35 qq/ha	5-25% 100 qq/ha	desde 15/5 75-90 qq/ha
Unión	50-100% 30-43 qq/ha	20% 30-36 qq/ha	10-35% 110 qq/ha	desde 15/5 80-95 qq/ha
Juarez Celman	70-100% 35-40 qq/ha	20-40% 25-30 qq/ha	10-20% 90 qq/ha	desde 1/6 85 qq/ha
Río Cuarto	15-35% 35 qq/ha	fin abril 22-35 qq/ha	10%, se picó 20-110 qq/ha	desde 30/5 60-100 qq/ha
Roque Saénz Peña	30-90% 33-40 qq/ha	pico 15 mayo 20-40 qq/ha	90% salvo al sur 100 qq/ha	desde junio 60-70 qq/ha
General Roca	60% 35 qq/ha	pico 15/5 28 qq/ha	10-100% (MRC*) 20-80 qq/ha	desde 30/5 70 qq/ha
Tercero Arriba	100% 28-32 qq/ha	20-95% 28 qq/ha	15% 50-90 qq/ha	desde 20/5 60-80 qq/ha
General San Martín	80-100% 35 qq/ha	50% 30 qq/ha	15-80% (MRC*) 85-100 qq/ha	Desde junio 85-100 qq/ha
Río Segundo	80-100% 21-40 qq/ha	30% 27 qq/ha	variable 80-100 qq/ha	desde junio no se informa
Río Primero	40-80% 32 qq/ha	10% 12-37 qq/ha	90%, salvo M. Cristo 80 qq/ha	desde 30/5 70-100 qq/ha
San Justo	99% 22-40 qq/ha	30-50% 30-35 qq	40-100% 80 qq/ha, salvo Freyre	desde junio 80-100 qq/ha

*MRC= Mal de Río Cuarto

Fuente: Bolsa de Cereales de Córdoba

MANÍ EN CÓRDOBA. Mayo 2007

Departamento	% Arrancado	% Trillado	Rto. en caja
Juarez Celman	98%	10-50%	35-38 qq/ha
Río Cuarto	50%	10%	35-38 qq/ha
General Roca	90%	10%	38-42 qq/ha
Tercero Arriba	100%	sin dato	30 qq/ha
Gral. San Martín	95%	40-85%	30 qq/ha
Río Segundo	95%	10%	25-30 qq/ha

Fuente: Bolsa de Cereales de Córdoba

GIRASOL EN CÓRDOBA. Mayo 2007

Departamento	Av. Cosecha	Rendimiento
Unión	98%	17-22 qq/ha
Río Cuarto	100% al 15/3	12-15 qq/ha
Roque Saénz Peña	100% al 15/3	15-18 qq/ha
General Roca	100% al 15/4	15 qq/ha

Fuente: Bolsa de Cereales de Córdoba

SORGO EN CÓRDOBA. Mayo 2007

DPTO	Av. Cosecha	Rendimiento
Unión	10%	60 qq/ha
Juarez Celman	2%	70 qq/ha
Tercero Arriba	2%	50-70 qq/ha
Gral. San Martín	30-100%	35-80 qq/ha
Río Segundo	60-80%	50-70 qq/ha
Río Primero	100% tempranos 50% tardíos	40 qq/ha tempranos 60 qq/ha tardíos
San Justo	50%	40-80 qq/ha

Fuente: Bolsa de Cereales de Córdoba

DEPARTAMENTO MARCOS JUAREZ

SOJA

Hacia mediados de abril, la soja de primera registraba avances de cosecha mínimos de 50% y máximos de 95% de superficie. Los rendimientos sufrieron una caída después del temporal, llevando los valores de 40 qq/ha estimados antes del temporal a rangos entre 30 y 38 qq/ha. Los principales problemas de calidad en esta mercadería fueron: manchados, podridos, quebrados y brotados que terminaron transformándose en agentes de disminución de rendimiento directa o merma por mala calidad con descuentos máximos de hasta 20% en la comercialización.

En el mismo período se había trillado entre un 1 y 30% de la superficie de soja de segunda. En estas los rendimientos informados oscilaron entre 25 y 35 qq/ha con promedios cercanos a los 30 qq/ha. Se espera una mejor calidad en estas sojas.

MAÍZ

El maíz de primera, listo para cosechar en los primeros días abril, debió esperar que las cosechadoras terminaran la trilla de soja, que es sensible al desgrane por apertura de vainas. Hacia finales de la primera quincena solo se había cosechado entre un 5- 25% del área sembrada. Los rendimientos promediarían los 100 qq/ha con las mejores situaciones en 130 qq/ha y las peores en 90 qq/ha.

El maíz de segunda, con su ciclo finalizado, y con rendimientos estimados entre 75 y 90 qq/ha, podría cosecharse a partir del 15 de mayo siempre y cuando las condiciones ambientales permitan la necesaria pérdida de humedad.

ALMACENAMIENTO

Uso de Silo Bolsa: en general su uso ha aumentado respecto al año anterior, aunque almacenando a veces con niveles de humedad riesgosos para la conservación. En esta región las causas del mayor uso serían fundamentalmente el mal estado de los caminos que impedía sacar la mercadería de los campos, siendo ésta la región de la provincia con mayores problemas de caminos. La existencia de pocas rutas alternativas conspiró contra la definitiva destrucción de algunos que ya estaban dañados o sin mantenimiento.

CULTIVOS INVERNALES

Si bien en poca superficie, en la zona aún se implantan verdeos y pasturas para consumo animal. Durante la primera quincena de abril, se encontraba a pleno la siembra de alfalfas, avenas, cebadillas, rye grass y triticales entre otros.

TRIGO: Aunque con excelentes condiciones de humedad en los suelos para la siembra del cereal, las intenciones están entre indefinidas hacia previsiones de disminución de superficie a sembrar, justificado por los aumentos en los precios de los fertilizantes junto a la fijación de precio de venta. La fecha de siembra se extendería desde el 10 de mayo hasta mediados de junio.

DEPARTAMENTO UNIÓN

SOJA

Hacia la primera quincena de abril, se había cosechado entre un 50 y 100 por ciento de la soja de primera en todo el departamento.

Las calidades obtenidas fueron de regulares a malas, con importante cantidad de granos podridos, manchados, con olor, arrugados, algunos brotados y con humedades mayores a las toleradas en la base de comercialización. Los descuentos máximos informados llegaron al 40%. Con todo esto los rendimientos finalmente obtenidos después del temporal oscilaron entre los 30-43 qq/ha. La amplia variabilidad ambiental hizo imposible llegar a un valor promedio de rendimiento zonal.

De soja de segunda se había cosechado en igual período, un 20 por ciento de la superficie implantada con una calidad algo mejor, pero presentando aún manchados y alta humedad. Se estimaron

rendimientos entre 30-36 qq/ha., con máximos de 40 qq/ha, valores aún buenos para una soja de segunda, normalmente de menor rendimiento.

Muchos lotes se encontraban anegados y/o aislados, debido a las precipitaciones y al ascenso de las napas freáticas. En la castigada Zona de Noetinger existen unas 80.000 has. de soja de primera y de segunda afectadas por agua en superficie, de las cuales unas 20.000 has. bajo agua no se cosecharían. En San Marcos, y al sur, zona Viamonte se informaba desborde de canales.

MAÍZ

El relegado maíz de primera llevaba entre un 10-35% de superficie cosechada al quince de Abril. Algunos lotes se cosechaban con niveles de humedad más altos que lo deseable, y los rendimientos promedios rondan los 110 qq/ha, salvo en la mencionada zona de Noetinger, cuyos valores solo llegaron a 80-90 qq/ha. explicados por granizos durante la floración.

El maíz de segunda, que se encuentra perdiendo humedad se cosecharía desde mediados de mayo en adelante según ritmo de disminución de humedad. En estos se observa buenos rendimientos estimados entre 80-95 qq/ha.

SORGO

El departamento reporta cultivos de Sorgo con escasa superficie cosechada por espera de maquinarias. Este cereal, también afectado por el temporal presentó brotados en planta madre y con rendimientos aproximados de 60 qq/ha.

GIRASOL

Hacia el Sur del departamento, zona Canals y Viamonte, se reportaba un 98% se superficie cosechada del girasol implantado, con rendimientos entre 17-22 qq/ha y excepcional buena calidad considerando las inadecuadas condiciones de producción del resto de la provincia.

ALMACENAMIENTO

Silo bolsa: se reporta un mayor uso respecto al año anterior debido principalmente a la dificultad de los caminos. En algunas zonas hasta llegaron a quedarse sin stock para la venta. De cualquier manera, la generalidad de la zona pretende sacar rápidamente la mercadería de este transitorio acopio debido a la alta humedad con que debieron embolsar, que pone en verdadero peligro la conservación del producto almacenado.

La persistencia del temporal de principios de abril transformaba los caminos de regulares malos a intransitables en casi todo el departamento.

CULTIVOS INVERNALES: La implantación de pasturas y verdeos en las escasas superficies destinadas a éstos se llevaba a cabo en la zona durante todo el mes de abril.

TRIGO: Aún con la humedad del suelo en nivel óptimo, es incierta a baja la intención de siembra debido a los menores márgenes que otorga el cereal. Las fechas de siembra normales para el departamento van desde el 10 de mayo al 30 de junio.

Algunos reservarían los suelos para un maíz de primera.

DEPARTAMENTO JUAREZ CELMAN

SOJA

Hasta el 24 de abril, se reportaba un avance de cosecha entre 70-100 % de la superficie implantada de Soja de primera con rendimientos entre 35-40 qq/ha. Las calidades en general malas, con granos manchados, podridos, algunos brotados y verdes.

Al mismo tiempo que se cosechaba la soja de primera comenzaban también las operaciones en soja de segunda, con avances cercanos al 20-40 % de superficie cosechada y rendimientos entre 25-30 qq/ha. Las mejores situaciones rendirían 35 qq/ha, pero los promedios estimados serían 28 qq/ha.

MAÍZ

El maíz de primera, sólo había podido ser recolectado en un 10-20% de la superficie implantada, los datos de rendimiento indican que en los no afectados por Mal de Río Cuarto podrían lograrse unos 100 qq/ha., y en los afectados solo unos 70 qq/ha. El promedio de la zona podría situarse en 90-95 qq/ha. Mientras tanto el Maíz de segunda se encuentra finalizando el ciclo y/o perdiendo humedad, y su cosecha podría comenzar a principios de junio. En estos, los rendimientos estimados rondarían los 85 qq/ha.

SORGO

El sorgo, al igual que el maíz, continúa a la espera de cosechadoras, y se estiman rendimientos cercanos a los 70 qq/ha.

ALMACENAMIENTO

Uso de silo Bolsa: con un importante incremento en relación al año anterior esta zona informa que además de soja, se embolsa parte del maíz cosechado. Algunos embolsan a sabiendas de los riesgos en los altos contenidos de humedad. Otros en cambio, entregan al acopio el material más húmedo y embolsan el más seco hasta tanto se normalicen la disponibilidad de camiones.

Solo al norte de Uacha debieron cortar totalmente el tránsito cerca de los primeros días de abril. El resto de la zona no mostró mayor gravedad para transitar.

CULTIVOS INVERNALES Y PASTURAS: todos los reportes señalaban que al 20 de abril se había sembrado el 100% de superficie destinada a alfalfas y verdeos. En la zona de La Carlota se reporta además algunos casos ataque de pulgón y trips sobre los cultivos.

Al igual que en el resto de los departamentos, las condiciones de humedad del suelo son satisfactorias para la siembra de Trigo, pero la intención de siembra relevada era menor o a lo sumo igual que el año pasado. En esta zona marginal para la producción del cereal la fecha de siembra estaría entre el 10 de mayo y 20 de junio.

MANÍ ZONA SUR

Abarca los sectores productivos de los departamentos Juárez Celman, Río Cuarto y General San Martín.

A finales de abril, se reportaba un 98% se superficie arrancada, aunque los avances de trilla de algunas zonas estaban entre 10 y 50% de lo arrancado según el establecimiento. Los rendimientos obtenidos, considerando las pérdidas post temporal, estaría alrededor de 35 a 38 qq/ha. Si bien la calidad tuvo alguna variabilidad entre los diferentes productores, todos señalaron nivel cero de contaminación con aflatoxinas, factor sumamente importante a la hora de la comercialización de la nuez.

Un reporte que incluye la visión de una vasta zona recorrida por varios profesionales, indica que en esta campaña se habrían obtenido buenas granulometrías, con el 60% de la producción sobre zaranda de 7,5 mm.

DEPARTAMENTO RIO CUARTO

SOJA

Al quince de abril la soja de primera se había cosechado en un 15 a 35% de la superficie implantada, lográndose rendimientos de 35 qq/ha en general, pero con extremos de 55 y 27 qq/ha., los mayores corresponden a valores excepcionales por precipitaciones y/o cercanía de napas y los menores a valores normales históricos.

En tanto, en la zona, la soja de segunda que estaba finalizando su ciclo, tendría su pico de cosecha hacia finales de abril, estimándose rendimientos entre los 22- 35 qq/ha.

La calidad obtenida está condicionada por la presencia de granos con hongos, brotados y partidos y/o perdidos por apertura de vainas, originada por granizadas en la precosecha. Algunas veces, granizadas antes de la cosecha disminuyeron fuertemente los rendimientos, aunque afectaron a pequeñas áreas. Varias fuentes confirman el alto nivel de precipitaciones registrados en este verano, y particularmente en marzo.

MAÍZ

El maíz de primera, esperaba la disponibilidad de máquinas y/o la pérdida de humedad para dar inicio formal a la cosecha (solo se había logrado recolectar un 10% de superficie en sectores puntuales). En la zona de Río Cuarto, la incidencia de la virosis Mal de Río Cuarto obligó a picar el material para darle destino a consumo animal, en virtud de los pobrísimos rendimientos que se lograrían en los materiales. Esta enfermedad terminó arrojando rendimientos ampliamente variables entre 20 y 110 qq/ha según grado de la enfermedad.

En tanto el maíz de segunda, finalizaba su ciclo y se disponía a perder humedad para ser cosechado a partir de fines de mayo y hasta julio. Se estima que la incidencia de Mal de Río Cuarto en éstos sería menor, pero igualmente condicionante de rendimientos variables entre 60-100 qq/ha.

GIRASOL

Las pequeñas zonas productoras de Girasol reportaban un 100% de superficie cosechada a mediados de marzo. Las precipitaciones durante floración desencadenaron fallas en la polinización y desarrollo de enfermedades, lo que se transformó en disminución de rendimiento tanto en qq/ha como en materia grasa sobre sustancia seca, cuya base de comercialización exige un mínimo 42% para no sufrir descuentos. Los magros rendimientos obtenidos se situaron entre 12-15 qq/ha, con excepciones de 24 qq/ha.

MANÍ ZONA SUR

Hacia el sur oeste de la provincia, zona Coronel Moldes, Washington, Vicuña Mackenna, Río Cuarto, la trilla estaba un poco más retrasada. Solo había un 10-12% de la superficie trillada sobre un 50% arrancado debido a que los lotes son de mayores extensiones, y las maquinarias escasas.

Los caminos complicaron la posibilidad de ingresar a los lotes o de trasladar dichas maquinarias, y en no pocos casos los mismos fueron arreglados por los propios usuarios.

ALMACENAMIENTO

Silo bolsa: la zona reporta algún incremento en el uso en relación al año anterior.

Los caminos, por sectores complicados, junto a los excesos de precipitaciones y falta de piso justificaron el uso de esta alternativa.

PASTURAS Y CULTIVOS INVERNALES: la humedad del perfil, en óptimas condiciones, permitió la siembra de verdeos y alfalfas, las cuales estarían finalizando hacia el 30 de abril.

TRIGO: las intenciones de siembra serían bajas. En general no es una zona que brinde aceptable seguridad para la producción económicamente rentable de este cereal, a lo que se suma el aumento en los costos de fertilizantes y la regulación del precio de venta que ejerce el estado.

DEPARTAMENTO ROQUE SAENZ PEÑA

SOJA

Hacia fines de abril, se había cosechado solo un 30% de la soja de primera en Serrano, pero casi la totalidad en Laboulaye. Los rendimientos obtenidos entre 33-40 qq/ha. fueron disminuidos después del temporal. En Laboulaye se reportaban lotes de soja perdidos por agua.

La soja de segunda comenzaba su cosecha, y se estimaba su pico hacia mediados de mayo. Hacia el sur, se esperaban 20 qq/ha, y más hacia el norte, unos 30-40 qq/ha.

Los graves problemas por la intransitabilidad de los caminos se reflejaron en el mayor uso de silo bolsa, aunque a veces se almacena con exceso de humedad.

Al 23 de abril, había en el departamento un 30% de lotes anegados sin posibilidad de ser cosechados.

MAIZ

La mayor superficie en siembras de primera, se había cosechado prácticamente en su totalidad en la zona Norte, pero solo el 20% en la zona sur. Los rendimientos informados están alrededor de los 100 qq/ha.

El poco maíz de segunda, se encuentra finalizando el ciclo, estimándose su cosecha para junio- julio, con rendimientos estimados en 60-70 qq/ha.

GIRASOL

En la zona Sur la cosecha de Girasol había finalizado el 15 de marzo, con rendimientos muy malos que a lo sumo llegaron a 15-18 qq/ha.

TRIGO

Las previsiones para la próxima siembra de trigo no serían buenas en este departamento. De producirse, la misma tendría lugar desde el 15 de mayo.

DEPARTAMENTO GENERAL ROCA

SOJA

Hacia fines de abril, se había logrado cosechar un 60% de la superficie de soja de primera, con rendimientos promedios de 35 qq/ha, aunque con extremos de 7-42 qq/ha. (los menores afectados por sequía y/o granizo).

La soja de segunda y la tardía por resiembra tendrían su pico de cosecha hacia el 15 de mayo. Se esperan rendimientos promedios de 28 qq/ha.

Los problemas de calidad en soja hacen referencia a la presencia de granos manchados, podridos, y algunos pocos verdes, originando mermas de 10%.

Malos Caminos (el 50% intransitables), pocos camiones y mayores rendimientos fueron los causales de mayor uso de silo bolsa, práctica de almacenamiento en la que se está obteniendo buena experiencia para su manejo en la zona.

MAÍZ

El Maíz de primera mostraba importante avance de cosecha, aunque la zona fue afectada por Mal de Río Cuarto obligando a picar algunos materiales que no brindarían buenos rendimientos. Por el mismo motivo los rendimientos que se informan en el departamento iban de 20-35 qq/ha. ó 70-80 qq/ha según presencia o ausencia de la virosis.

Mientras tanto, el maíz de segunda está finalizando su ciclo con riesgo por la incidencia de heladas tempranas. Se espera cosechar a partir de fines de mayo- junio con rendimientos promedios de 70 qq/ha.

GIRASOL

Los reportes sobre cultivo de girasol indican que la cosecha habría finalizado el 15 de abril en los más tardíos. Se registraron importantes problemas sanitarios durante el ciclo y fallas en la polinización que determinaron los bajos rendimientos alcanzados, 15 qq/ha en promedio, cuando la zona tiene potencial para lograr 25-30 qq/ha.

MANÍ ZONA SUR

Hay importante participación de Maní en la zona. La mayoría ya arrancado, pero aún con poca trilla hacia fines de abril, y con rendimientos entre 38-42 qq/ha de maní en caja.

CULTIVOS INVERNALES Y PASTURAS

Las pasturas y verdeos habían finalizado su siembra en el departamento. Solo resta comenzar la siembra de trigo, a partir del 2 de mayo, aunque las expectativas con este cultivo son realmente malas. Solo unos pocos propietarios apostarían al cereal, ya que los márgenes del cultivo hacen imposible su inclusión en lotes arrendados.

DEPARTAMENTO TERCERO ARRIBA

SOJA

Hacia el 25 de abril se había logrado recolectar casi el 100% de la poca superficie de soja de primera del departamento con rendimientos promedios entre 28-32 qq/ha, aunque con extremos de 16 y 35 qq/ha. En cuanto a la calidad obtenida se anticipaban graves problemas en la calidad de la futura semilla.

La soja de segunda, para la misma fecha, se cosechaba en diferentes momentos dentro del departamento, ya que los reportes eran de 20 y 95% de superficie. Los rendimientos estimados extremos de 18-40 qq/ha, terminarían promediando en 28 qq/ha en casi todo el departamento.

MAÍZ

El maíz de primera, como en el resto de la provincia, esperaba la disponibilidad de cosechadoras. Sólo en Hernando y Corralito se informaron avances de cosecha cercanos al 15% de superficie. En el resto del departamento la cosecha iniciaría hacia el 20 de mayo. Los rendimientos estimados varían entre 50-90 qq/ha según grado de tecnología aplicado en el cultivo y nivel de daño de Mal de Río IV.

En tanto el maíz de segunda, finalizaba la madurez fisiológica y espera cosecharse a partir del 15- 20 de mayo y hasta el 30 de julio según el ritmo de descenso de humedad que muestren los materiales. Se estiman rendimientos entre 60-80 qq/ha., pero habrá que continuar atentos a la aparición de enfermedades foliares, potencial agente de disminución de rendimiento.

SORGO

El cultivo de sorgo en la zona, con ciclo finalizado y a la espera de maquinarias, comenzaba a cosecharse con problemas de desgrane y brotados que terminaban definiendo rendimientos entre 50-70 qq/ha.

ALMACENAMIENTO

La zona revela un aumento en el uso del silo bolsa, aunque se almacenaba como medida de emergencia aún con niveles de humedad algo elevados en soja. Pero no es solo soja lo que se almacena, también se guarda sorgo y maíz.

Los caminos, con problemas puntuales, aún están transitables, pero se alerta sobre la pronta necesidad de reparación.

MANÍ ZONA NORTE

En el departamento se arrancó prácticamente el 100% de la superficie implantada, aunque el porcentaje de trilla es muy bajo aún. Los pocos datos sobre rendimientos indican que podrían lograrse unos 30 qq/ha. de maní en caja, aunque se reporta alto contenido de tierra por las condiciones de arrancado con barro.

TRIGO

La humedad del suelo es buena, aunque sería necesaria una lluvia de 30 mm. para asegurar el éxito en la próxima siembra de trigo que tendría lugar desde el 10/5 y hasta el 15/7, según oportunidad climática. En Almafuerte se reportaba al 26 de abril la siembra de las primeras 1000 hectáreas de trigo. Sobre el cereal, las expectativas para el resto del departamento todavía no se definen, aunque se resalta aumento en el precio de fertilizantes.

En Corralito, algunos reportes indicaban falta de stock de urea, y en Almafuerte falta Atrazina.

DEPARTAMENTO GENERAL SAN MARTÍN

SOJA

A fines de abril se reportaba entre 80 y 100% de superficie cosechada de soja de primera con rendimientos cercanos a los 35 qq/ha, exceptuando zonas con suelos sódicos en las cercanías de Villa María o lotes aislados con problemas climáticos que solo permitieron unos 20 qq/ha de rendimiento. En un sector aún más marginal, Zona Silvio Péllico, los rendimientos solo alcanzaron 12 ó 22 qq/ha según el antecesor del cultivo fuera soja o maíz.

La calidad previa al temporal era mejor que la desencadenada luego. Casi la totalidad de la mercadería presentaba granos manchados, con mohos, chuzos, partidos y pocos verdes y brotados.

La soja de segunda, presentaba avances de cosecha cercanos al 50 % de superficie y rendimientos estimados de 30 qq/ha, salvo en lotes de La Playosa y Silvio Péllico, donde solo se alcanzaban 24 y 21 qq/ha.

ALMACENAMIENTO

El uso de silo bolsa se incrementó según la zona entre 25-100% respecto al año anterior por motivos relacionados a caminos, escasa disponibilidad de camiones, costo de los fletes, y mayores rendimientos. Las condiciones ambientales obligaron a veces a almacenar con niveles de humedad riesgosos para la conservación aún a corto plazo.

Los caminos de la zona, muy dañados en La Laguna, Etruria, Pasco y Ticino impedían el paso en algunos sectores, mientras que en otros aún permitían el tránsito de camiones y maquinarias.

MAÍZ

El maíz de primera presentaba avances de cosecha totalmente diferentes según las localidades relevadas, con mínimos de 10-15% de superficie en Etruria y Villa María y máximos de 80 y 100% en Ticino y Silvio Péllico. Los rendimientos, a veces condicionados por la incidencia de Mal de Río IV, oscilaron entre 85-100 qq/ha. Algunos lotes muy afectados fueron picados. En la zona de Chazón se comentó la aparición de granos brotados dentro de la espiga previo a la cosecha. Los menores rendimientos se reportaron en la zona de Silvio Péllico con 65 qq/ha.

El maíz de segunda está finalizando el ciclo, y podría comenzar a cosecharse recién a partir de junio. Los pocos datos sobre rendimientos estimados indicarían valores similares a los maíces de primera.

SORGO

Se reportaba cosecha en Villa María, Arroyo Cabral y Silvio Péllico. Los rendimientos alcanzados estarían alrededor de 60 qq/ha, con mínimos de 35 y máximos de 80 qq/ha y alta presencia de brotados en precosecha. Otras zonas del departamento continúan esperando la disponibilidad de cosechadoras.

MANI ZONA NORTE: La Laguna, Ticino, Arroyo Cabral y Chazón habría entre un 40 y 85% de superficie ya trillada, con rendimientos cercanos a los 30 qq/ha de maní en caja. Los principales problemas de la poscosecha se refieren a contenidos de tierra.

TRIGO

La humedad del suelo permitiría la siembra sin mayores inconvenientes aunque las expectativas aún están poco definidas. La siembra tendría lugar desde el 15 de mayo.

DEPARTAMENTO RIO SEGUNDO

SOJA

Hacia el 20 de abril se reportaba un 80-100% de superficie de soja de primera cosechada, salvo en Oncativo que reportaba solo un 40% de avance. Los rendimientos variaron antes y después del temporal de principios de abril. Los mejores valores pre temporal llegaron a 40 qq/ha, pero luego hubo caídas hasta 21 qq/ha. Será difícil establecer un rendimiento promedio “justo” para el departamento. Las pérdidas de calidad se refieren a granos manchados, podridos, arrugados y se anticipa muy mala calidad de para semilla de lo producido en la zona.

La soja de segunda, con avances de cosecha cercanos a 30% en esa misma época, rendiría en promedio 27 qq/ha. También se verificaron problemas de calidad en esta soja, aunque tal vez en un grado más leve.

ALMACENAMIENTO

El uso de silo bolsa, igual o mayor al año pasado según la zona, compensó la falta de camiones o permitió diferir en el tiempo el alto costo de fletes. Varios reportes indican que se está aprendiendo a manejar la condición de almacenamiento, procurando guardar seco en la mayoría de los casos.

Los caminos en el departamento presentan zonas con problemas de napas (Matorrales), con serios problemas para la circulación, mientras que los caminos más altos estarían en mejores condiciones para la circulación.

MAÍZ

El maíz de primera, con avances de cosecha máximos en Pozo del Molle, Río Segundo y Carrilobo, medios en Las Junturas, y mínimos en el resto del departamento, los rendimientos informados oscilaban 80-100 qq/ha, con los menores valores correspondían a lotes con brotados.

El maíz de segunda, aún con hojas, y verde, se cosecharía a partir de junio, pero todavía no se estiman rendimientos.

SORGO

Cosechado en un 60-80% de la superficie implantada, con rindes entre 50-70 qq/ha según las pérdidas por desgrane y la cantidad de brotados originados luego del temporal de principios de abril.

MANÍ ZONA NORTE

En la zona de Las Junturas, el cultivo llevaba un 10% de trilla. Se informaba desprendimiento de vainas y los rendimientos oscilan los 25-30 qq/ha de maní en caja (granos livianos).

TRIGO

Los perfiles del suelo estaban óptimos para la siembra de trigo (opuestamente a la situación del año pasado), la siembra tendría lugar a partir del 15 del mayo y las intenciones de iguales a levemente superiores respecto al año 2006.

DEPARTAMENTO RIO I

SOJA

Los relevamientos de fines de abril señalaban la cosecha de entre un 40-80% de superficie de soja de primera. En la zona de La Puerta solo se habría sembrado soja tardía, debido a las condiciones

ambientales negativas para la siembra de soja de primera. En el resto del departamento, la soja de primera alcanzaba rendimientos promedios de 32 qq/ha con extremos de 28 y 50 qq/ha en las situaciones más especiales.

La soja de segunda, y también la soja tardía, recién comenzaba a cosecharse en aquel momento, previéndose el pico para principios de mayo. Los rendimientos esperados promediarían los 27 qq/ha, con extremos de 12 y 37 qq/ha, siendo los menores explicados por el temporal de principio de abril.

Como en toda la zona de producción provincial, se observaron granos con hongos, manchados, podridos, arrugados, algunos verdes y quebrados. Se resaltaba la mala calidad de la semilla de grupos cortos.

ALMACENAMIENTO

El uso de silo bolsa se incrementó en todo el departamento atendiendo la falta de camiones y los mayores rendimientos, aunque se sabe que los niveles de humedad con que se almacenó la soja comprometen la durabilidad del producto.

Los caminos estaban muy deteriorados en general. En Va. Santa Rosa se reportaba hasta un 80% de caminos intransitables.

MAÍZ

El maíz de primera se había cosechado casi en su totalidad exceptuando la zona de Monte Cristo, donde el avance solo era del 20% de superficie a fines de abril. Los rendimientos promediarían los 80 qq/ha, con extremos de 70 y 90 qq/ha según zona y tecnología de cultivo. Tampoco se sembró Maíz de primera en la zona de La Puerta.

El maíz de segunda, se encontraba llenando el grano, con estimación de cosecha para fines de mayo, extendiéndose hasta julio- agosto. Se esperan rendimientos entre 70-100 qq/ha debido al buen estado de los cultivos, aunque habrá que esperar más definiciones para un rendimiento promedio.

SORGO

El sorgo temprano de la zona se había cosechado totalmente hacia fines de abril, con rendimientos promedios de 40 qq/ha y con problemas de brotados. El sorgo tardío, con cosecha cercana al 50% de la superficie, estaría rindiendo entre 60-65 qq/ha. también en estos hay problemas de brotados y desgrane de las panojas.

PASTURAS Y VERDEOS: en la zona ya han sido sembradas, gracias a las buenas condiciones de humedad en el suelo.

TRIGO: Las intenciones serían iguales a levemente mayores a las del año 2006, pero podrían darse cambios hasta la efectiva fecha de siembra prevista para la primera quincena de mayo.

DEPARTAMENTO SAN JUSTO

SOJA

Hacia fines de abril, se había cosechado prácticamente toda la soja de primera. Hubo muchas pérdidas por el temporal que terminaron reduciendo rendimientos. Como promedio se informan 30 qq/ha, pero hay extremos de 22-40 qq/ha. Hasta el 20 de abril, aún había superficie bajo agua en algunas zonas del departamento. En Tránsito se informaban pérdidas de hasta un 70% debido al temporal. En este contexto la calidad cosechada en todo el departamento fue regular debido a la presencia de hongos, manchados, brotados, verdes y granos con bajo peso.

La soja de segunda con avances de cosecha entre 30-50% al 20 de abril, tomaría rápido ritmo de recolección. Se esperaban rendimientos cercanos a los 30-35 qq/ha. Resta aún cosechar la soja tardía de diciembre.

ALMACENAMIENTO

La falta de camiones, y el estado de los caminos fueron los principales causantes del aumento en el uso de silo bolsa que se produjo en esta cosecha. A esto se sumó el mayor rendimiento obtenido en relación a otras campañas y el mayor volumen que implica el almacenamiento de maíz.

Los problemas más graves de caminos fueron señalados para las zonas de Tránsito, Sacanta y El Arañado, el resto del departamento tenía problemas menores.

MAIZ

El maíz de primera, con avances de cosecha de 40-100% de superficie, rendía 80 qq/ha en promedio, excepto en la zona de Freyre, en la que solo se lograron 25-60 qq/ha. Los principales problemas durante la cosecha fueron la presencia de hongos y brotados, acentuados por el temporal.

El maíz de segunda, se cosecharía desde principio de junio. Las estimaciones de rendimientos indican valores entre 80-100 qq/ha, aunque habrá que esperar la finalización del ciclo para una valoración más certera.

SORGO

Destinado a uso interno en alimentación animal principalmente, estaban también en plena cosecha hacia fines de abril. Los rendimientos entre 40-80 qq/ha. La variabilidad es explicada por la presencia de brotados, lavado, la acción de pájaros y desgrane.

VERDEOS Y PASTURAS: la siembra se encontraba prácticamente finalizada, gracias al buen estado de reservas hídrica de los suelos.

TRIGO: se sembraría desde principios de mayo, aunque las expectativas varían según la zona. En Arroyito se reportaba escasez de semilla, pero en La Tordilla la superficie de siembra caería un 30% respecto al año anterior.

Ing. Agr. Silvina Fiant
Bolsa de Cereales de Córdoba