BOLSA DE CEREALES DE CÓRDOBA Y
CÁMARA DE CEREALES Y AFINES DE CÓRDOBA
TRIBUNAL ARBITRAL

CULTIVOS DE VERANO: condición de los cultivos 2008.

Relevamiento del 25 de Enero al 08 de Febrero de 2008.
Zona Sur: Departamentos Tercero Arriba, General San Martín, Río Cuarto, Juárez Celman, Unión, Marcos Juárez, Roque Sáenz Peña y General Roca.

GENERALIDADES DEL PERÍODO

Caminos: Otra vez comienzan los reportes de complicaciones, así como la previsión de dificultades para trasladar la próxima cosecha debido al estado de conservación de rutas y caminos. Si bien las precipitaciones no aportan lo suficiente para los cultivos, algunas veces bastan para entorpecer la transitabilidad o para incrementar el deterioro de las vías de comunicación.

Combustibles: No solo se repite la dificultad de conseguir el insumo y/o de abonar un mayor costo por el mismo, sino que además ahora el impacto llegó hasta el aumento de las tarifas que establecen los contratistas de maquinarias agrícolas para la próxima cosecha.

MAÍZ DE 1º: Los rendimientos están casi definidos y ya se observan, de acuerdo a las primeras estimaciones, los efectos de la sequía, granizo y otros factores adversos que debieron soportar este año los maíces de primera. Lo peor del caso, es la alta participación dentro del total del maíz que adquieren estos materiales en este sector de la provincia.

Departamento	MAÍZ de 1º 2006/07	MAÍZ de 1º 2007/08º
	Rto. Promedio (julio `07)	1º estimación febrero 2008
Marcos Juárez	100 qq/ha.	70-100 qq/ha
Unión	100 qq/ha.	75-100 qq/ha
Juárez Celman	85 qq/ha.(*MRC)	45-80 qq/ha
Río Cuarto	80 qq/ha. (*MRC)	40-80 qq/ha
Roque Sáenz Peña	85 qq/ha.	55-80 qq/ha
Gral. Roca	66 qq/ha (*MRC)	50-60 qq/ha
Tercero Arriba	75 qq/ha (*MRC)	40-65 qq/ha
Gral. San Martín	83 qq/ha.	50-80 qq/ha

Fuente: A partir de datos recolectados por Bolsa de Cereales de Córdoba

MAÍZ DE 2º PERÍODO CRÍTICO. Con la mayor esperanza puesta en los cultivos sembrados más tarde (que aún tienen chances de recuperación), comienza la floración en los maíces de segunda y en los pocos que se resembraron a último momento. Las últimas lluvias acaecidas permitirían sobrellevar este período crítico con relativa tranquilidad.

SOJA 1º PERÍODO CRÍTICO- RIESGO DE ROYA. Finalizó la etapa vegetativa y se transitan los momentos decisivos para la definición de rendimientos (llenado de vainas). Algunas veces las condiciones ambientales determinan alto riesgo para instalación de las perjudiciales enfermedades de fin de ciclo y la peligrosa Roya de la Soja. Afortunadamente, de esta última aún no hay casos reportados en nuestra provincia. Las primeras estimaciones de rendimientos, aunque con amplio rango y poca precisión aún, muestran las consecuencias de las situaciones ambientales sufridas desde noviembre a enero.

Departamento	**SOJA de 1º 2006/07**	**SOJA de 1º 2007/08**
	Rto promedio 2007	1º estimación febrero 2008
Marcos Juárez	32-38 qq/ha	25-35 qq/ha
Unión	38 qq/ha	20-35 qq/ha
Juárez Celman	35 qq/ha	25-40 qq/ha
Río Cuarto	35 qq/ha	20-30 qq/ha
Roque Sáenz Peña	32 qq/ha	10-38 qq/ha
General Roca	32 qq/ha	25-28 qq/ha
Tercero Arriba	30 qq/ha	20 qq/ha
General San Martín	**31 qq/ha**	**15-30 qq/ha**

Fuente: A partir de datos recolectados por Bolsa de Cereales de Córdoba

MANI: Este es el cultivo que mejor recuperación y estado muestra considerando los estresantes cuadros de sequías y temperaturas vividas los meses anteriores.
De acuerdo a estas observaciones, y de progresar el ciclo en condiciones ambientales normales, podrían lograrse buenos a muy buenos rendimientos para esta campaña, aunque aún falta transitar un buen camino en el cual adquieren especial importancia la presencia y control de viruelas y malezas.

Lote de alfalfa en floración. Enero de 2008
Fuente Bolsa de Cereales de Córdoba

Lote de sorgo llenando grano. Enero de 2008
Fuente Bolsa de Cereales de Córdoba

DEPARTAMENTO TERCERO ARRIBA

El mes de enero finalizó aportando precipitaciones muy dispares, entre 186-313 mm. de acumulado mensual. En tanto, en los primeros días de febrero (hasta el 13) se sumaban entre 4-28 mm. (www.bccba.com.ar / Precipitaciones). Muchas veces fue más que necesaria la utilización de riego complementario que existe en algunas zonas de este departamento. Las temperaturas se normalizaron en este período con valores típicos de la estación estival.

MAÍZ

Más del 80% del total de maíz se hace con siembras de primera en el departamento, y dichos cultivos se encuentran al momento de este informe en estado regular, en etapa de llenado de grano- grano pastoso. Las consecuencias de las pasadas situaciones de estrés impactaron directamente en el rendimiento posible de obtener, reportándose como probables valores de 40-65 qq/ha.

El maíz de segunda o los tardíos están entre 6 hojas y comienzo de floración, sin mayores problemas. Muy pocos lotes han recibido alguna refertilización posterior a la siembra, aplicando fundamentalmente uan, urea en aportes de 25-40 Kg. /ha de nitrógeno elemento.

SOJA

La soja de primera está entre plena floración y comienzo de llenado de semilla (R2- R5) en estado general bueno a regular. Los rendimientos, condicionados por los pasados cuadros de estrés térmico e hídrico, podrían rondar los 18-20 qq/ha, con excepcionales zonas de 30 qq/ha. Comienzan a aparecer algunas enfermedades como *septoria*, *cercóspora y xanthomonas.*

La soja de segunda y la resembrada, están finalizando la etapa vegetativa e iniciando la floración, en estado bueno o muy bueno, sin daños o estrés de importancia.

Entre las plagas presentes se mencionan una o varias de las siguientes: chinche, orugas, tucuras, hormigas y arañuelas aunque no se trata de ataques generalizados.

En cualquiera de los casos los aportes de fertilizaciones posteriores a la siembra son mínimos.

GIRASOL

Los pocos lotes del departamento están en madurez fisiológica, en estado bueno, aunque con gran variabilidad en los rendimientos probables entre 12-20 qq/ha. Algunos lotes han sido invadidos por malezas debido a la poca eficacia de los herbicidas aplicados en inadecuadas condiciones ambientales. La cosecha comenzaría a fines de febrero, salvo puntuales lotes ya cosechados en la zona de James Craick.

MANÍ

En cuanto a fenología el maní transita etapas de floración, clavado y llenado de cajas con cultivos en buen estado. Se están aplicando los fungicidas para control de viruelas con buena efectividad (de 1 a 3 aplicaciones hasta el momento). Se ha reportado presencia de arañuela en lotes de la zona de Hernando.

SORGO

Con Cultivos entre floración y llenado de grano, el ciclo va finalizando, y la gran mayoría de los lotes han sido afectados en algún momento por estrés hídrico y/o térmico.

DEPARTAMENTO GENERAL SAN MARTIN

Enero cerró con precipitaciones muy diferentes según zonas de este departamento. Según www.bccba.com.ar / Precipitaciones, los aportes estuvieron entre 87-236 mm acumulados en todo el mes. En Febrero, hasta el 13, se suman entre8-32 mm. Las zonas que lo disponen hicieron un muy oportuno uso de riego complementario en este período.
En cuanto a las temperaturas, al cierre del informe se van normalizando los registros, luego de altos picos registrados en la primea quincena de enero.

MAÍZ
Cerca del 80% del total de maíz del departamento se siembra en fechas de primera. Estos cultivos se encuentran entre madurez fisiológica y grano pastoso, en estado regular y mostrando las secuelas del fuerte estrés térmico e hídrico sufrido durante la floración. Esta situación ha condicionado los futuros rendimientos, relegándolos a valores entre 50-80 qq/ha. con zonas aún mas castigadas que rendirían tan solo 30 qq/ha. No hay que desconocer que en muchos lotes las plantas fueron picadas para uso forrajero (ejemplo zona La Playosa).
En tanto, el 20% restante de maíz de segunda y los pocos lotes resembrados de maíz de primera, están en muy buen estado, entre 8 hojas y floración. En estos materiales están puestas las esperanzas de lograr mejores rendimientos, para lo cual se han refertilizado con unos 50 Kg. /ha de nitrógeno elemento.

SOJA
La soja de primera está en plena etapa de llenado de vainas (R5), aunque los lotes más atrasados están floración (R1- R2). El estado general de los lotes es malo en los más adelantados y regular en los más atrasados. La zona de La Playosa reporta pérdida de lotes completos a causa de sequía y calor. Los rendimientos podrían disminuir este año sobre todo en los primeros lotes a cosechar de acuerdo con la gravedad del estrés soportado en enero. Los peores rondarían los 15 qq/ha., mientras que los mejores podrían oscilar en los 30 qq/ha.
La soja de segunda y las pocas que han sido resembradas, con escalonado grado de avance en el ciclo (idéntico al escalonamiento en fecha de siembra), atraviesan aún etapas vegetativas y las primeras reproductivas, con cultivos en buen estado poco afectados por estrés y con algunos reportes de isocas, tucuras y arañuelas cuya acción se controla con aplicación de insecticidas como clorpirifós y dimetoato. Las fertilizaciones post siembra han sido mínimas.

GIRASOL
Se estima inicio de cosecha para los últimos días de febrero. Si bien son pocos lotes, se encuentran en madurez fisiológica, en buen estado y se estiman rendimientos cercanos a 20 qq/ha.

MANÍ
La presencia de este cultivo en el departamento es de considerable importancia. La mayoría de los lotes se encuentran entre floración y llenado de cajas con cultivos en muy buen estado. Se reportan casos puntuales de arañuela y los primeros casos de viruelas, estas últimas controladas con los correspondientes fungicidas aplicados en tiempo y forma (de 1-3 aplicaciones).

SORGO
La mayoría de los lotes están emitiendo panoja a la fecha de este informe, aunque los sembrados más tarde están entre 5-6 hojas. El estado general es bueno a regular y entre los daños citados se nombraron ataques de orugas cogolleras, estrés térmico e hídrico.

DEPARTAMENTO RÍO CUARTO

Enero finalizó aportando entre 137-353 mm. de precipitaciones, mientras que en febrero, hasta el 13 se reportan otros 11-47 mm. acumulados. (www.bccba.com.ar / Precipitaciones). Algunas precipitaciones produjeron problemas de importancia sea por volumen o por la incidencia de granizo acompañante. Con esto se vuelven a poner de manifiesto problemas con algunas rutas que empeorarán con la próxima cosecha.
Quienes cuentan con riego, este año hicieron especial aprovechamiento de esta ventaja.
En cuanto a las temperaturas, hacia la segunda quincena de enero se normalizaban los altos registros de la anterior quincena. A la fecha de este informe el régimen térmico se encontraría normalizado de acuerdo con la época del año.

MAÍZ
Al igual que en el Dpto. Gral. San Martín, cerca del 80% del total de maíz del departamento se siembra en fechas de primera.
A los reportes de estrés de otras zonas, se deben sumar en este departamento la incidencia de granizadas diversas las cuales desencadenaron resiembras en algunos sectores (estos cultivos están hoy entre 4 hojas y floración). Los cultivos de primera se encuentran en grano pastoso, y los rendimientos estimados son muy variables en este departamento con valores entre 40-80qq/ha. No son pocos los lotes que se han picado para uso forrajero.
Los cultivos de segunda están entre 5 hojas y floración y entre los principales daños se nombraron estrés hídrico y granizo y algunos lotes con ataque de (orugas) barrenador, cogolleras y medidoras, aparentemente todo ha sido superado a la fecha de este informe. Algunos de estos lotes han recibido una refertilización nitrogenada de unos 40 Kg. /ha. de nitrógeno elemento.

SOJA
La soja de primera está en pleno estado reproductivo, entre floración y llenado de vaina. Los lotes están en variable estado entre buenos y muy buenos, con marcas del pasado estrés hídrico, térmico y granizadas que desencadenaron pérdida de flores, hecho que se trasladará al rendimiento futuro (de 20 a 30 qq/ha.).
La soja de segunda finaliza los estadíos vegetativos, con pocos lotes ya en plena etapa reproductiva. Entre los daños de esta se mencionaron isocas medidoras, chinches, arañuelas, tucuras (controladas con insecticidas) y algunos lotes también afectados por falta de precipitaciones.
Los lotes que debieron ser resembrados se encuentran entre 1 y 8 hojas, con últimas fechas de siembra reportadas al 18 de enero.

GIRASOL
Con poca cantidad de hectáreas, pero repartidas en casi todo el departamento, los lotes se encuentran en madurez fisiológica en estado bueno a regular. La cosecha tendría lugar desde el 20 de febrero, y se estiman (con dificultad) rendimientos cercanos a los 20-25 qq/ha.

MANÍ
Los lotes del departamento se encuentran en etapa de clavado en estado general bueno. A la fecha ya se ha hecho una aplicación para control de viruelas.

SORGO
Con participación y distribución similar al girasol, los sorgos del departamento se encuentran entre floración y llenado de grano con lotes en buen estado y sin síntomas de estrés.

DEPARTAMENTO JUAREZ CELMAN

Las lluvias de enero acumularon entre 133-316 mm. de precipitaciones, mientras que hasta el 13 de febrero se agregaron entre 2-82 mm. (www.bccba.com.ar / Precipitaciones). Algunas de estas fueron acompañadas de granizo, y se reportan daños en al zona de Carnerillo sobre lotes de soja. Quienes cuentan con riego, este año hicieron real aprovechamiento de esta ventaja.
En cuanto a temperaturas, estarían normalizadas para la época en estos días, aunque se recalcan los altos registros de la primera quincena de enero.

MAÍZ
Al igual que en los Dptos. Gral. San Martín y Río Cuarto, cerca del 80% del total de maíz del departamento se siembra en fechas de primera, aunque como diferencia, también se reportaron siembras tardías y resiembras de maíces de primera perdidos por estrés.
La mayor parte del maíz de primera se encuentra entre grano pastoso y fin de llenado, en estado regular, con rendimientos probables entre 45-80 qq/ha., variabilidad explicada según la incidencia de estrés hídrico y térmico de la floración.
El maíz de segunda está entre 6 hojas y floración en estado general bueno a muy bueno. No se reportan daños de importancia sobre estos lotes, salvo algunos casos de *helminthosporium sp*. Las refertilizaciones tuvieron lugar pero en menor medida que sobre los maíces de primera, aportando en los de segunda entre 15-70 kg/ha. de nitrógeno elemento.

SOJA
La soja de primera, en plenitud de etapa reproductiva, muestra secuelas del pasado estrés térmico e hídrico soportado. Además de los particulares climáticos ha soportado ataques de plagas como loxostege y arañuela para las cuales fue necesaria la aplicación de insecticidas como dimetotato o clorpirifós. Con todas estas adversidades, se estiman hoy futuros rendimientos de entre 25-40 qq/ha.
La soja de segunda y la poca de primera que debió ser resembrada están entre etapa vegetativa y comienzo de la reproductiva con cultivos en buen estado y sin reportar daños de mayor importancia.

MANI
Con importante presencia en el departamento, este cultivo atraviesa las etapas de floración a llenado de cajas, con lotes hoy en buen estado pero que han debido sobreponerse a cuadros de sequía y ataques de arañuelas. En tanto para las endémicas viruelas, se han realizado los primeros controles químicos con buena efectividad.

SORGO
Con la mayoría de lotes entre floración y llenado, el ciclo progresa con cultivos hoy en buen estado, sin mayores daños que los producidos por la falta de agua de anteriores períodos.

DEPARTAMENTO UNIÓN

Las lluvias de enero terminaron acumulando entre 100-155 mm. de precipitaciones; mientras que hasta el 13 de febrero se sumaban entre 7-32 mm. adicionales (www.bccba.com.ar / Precipitaciones).
En tanto las temperaturas retoman la normalidad es sus valores después de la segunda quincena de enero.

MAÍZ
Este es uno de los departamentos en los que mayor participación alcanza el maíz de primera en relación al total de la gramínea, excediendo el 90% en casi todo el departamento. Estos cultivos, entre

grano lechoso y pastoso, se encuentran en buen estado pese a las pasadas adversidades soportadas (heladas, sequía, altas temperaturas, vientos, etc.). Los rendimientos a alcanzar podrían rondar los 75-100 qq/ha, excluyendo a la particular zona de Noetinger que solo lograría unos 50 qq/ha.
Los maíces de segunda muestran mejor condición de cultivo, atravesando aún etapas vegetativos (entre 6-9 hojas). Algunos de estos maíces se han refertilizado incorporando entre 30-60 kg/ha. de nitrógeno elemento.

SOJA
La Soja de primera está atravesando el período crítico de comienzo de llenado de vaina (R5), con los lotes más atrasados en R3 y los más adelantados en R6. la mayoría de los lotes ha debido superar adversidades como falta de agua, calor, ataque de chinche, isocas, loxostege, arañuelas y trips, plagas controladas con insecticidas piretroides. Con todo, se calcula que los rendimientos podrían rondar los 20-35 qq/ha. según las particularidades de cada ambiente.
La soja de segunda y la resembrada muestran gran amplitud en los estadíos fenológicos de acuerdo al escalonamiento en fechas de siembra. Las más adelantadas inician la floración (R1), mientras que las últimas en sembrarse están en V2 (dos nudos con hojas). Estos lotes no muestran sufrimiento de estrés y los cultivos se observan en buen estado.

GIRASOL
El cultivo, presente solo en algunos sectores del departamento, está en etapa de llenado de grano con lotes en buen estado. Se estima cosecha a partir del 20 de febrero y los rendimientos podrían alcanzar los 25 qq/ha.

SORGO
El ciclo avanza y los lotes están en llenado de grano ó grano pastoso. El estado general es bueno gracias a la rusticidad de esta gramínea que le permitió sobrellevar los pasados cuadros de sequía y altas temperaturas. Las primeras estimaciones de rendimientos de este año estarían por encima de los 60 qq/ha.

ALFALFA
La reina de la pastura ha ofrecido hasta tres cortes, superando problemas de pulgones, isocas y trips que repercutieron en una menor producción de pasto.

DEPARTAMENTO MARCOS JUAREZ

Enero finalizó aportando entre 68-109 mm. de precipitaciones, acompañándose de granizo en el sector sur-este del departamento con daños de importancia sobre maíz y soja. Mientras en febrero, hasta el 13, se sumaron de 20 a 30 mm. adicionales (www.bccba.com.ar / Precipitaciones).
En cuanto a las temperaturas, las mismas ahora se presentan normales de acuerdo a la época del año.
Las condiciones globales de este período traen u poco de alivio a la condición de todos los cultivos.

MAÍZ
Al igual que en el Dpto. Unión, más del 90% del total de maíz se hace en siembras de primera. Estos cultivos se encuentran entre grano pastoso y madurez, con cierta heterogeneidad hasta dentro de cada lote. Los cultivos se observan en estado regular a bueno; algunos han sido afectados por granizo, y se estiman rendimientos entre 70-100 qq/ha. para esta campaña, exceptuando las zonas de Leones e Inriville (de menor potencial de producción).
El maíz de segunda (y los pocos resembrados) están entre 5 hojas e inicio de floración observándose buen estado en los cultivos. Aprovechando las mejores condiciones ambientales de este período,

algunos han decidido refertilizar aplicando nitrógeno en cantidades entre 30-60 kg/ha. con aplicaciones en general líquidas. En algunos lotes se observaron problemas de diatraea.

SOJA
La soja de primera está en plenitud de estadíos reproductivos entre inicio de floración e inicio de llenado de vainas (R1-R5). El estado de los cultivos es bueno, aunque persisten las secuelas de las adversidades de enero. La atención en este período está puesta en el control de chinches y arañuelas y en la prevención de enfermedades de fin de ciclo. Se estiman rendimientos futuros de 25-35 qq/ha.
La soja de segunda y la resembrada por daños están llegando al final de la fase vegetativa y entran a la reproductiva con cultivos en mejor estado que la sembrada en fechas de primera. Las fertilizaciones post siembra son mínimas, y prácticamente experimentales ya que adicionan en fertilizaciones foliares micro nutrientes como Boro, Manganeso, Molibdeno y otros.

GIRASOL
Se reporta presencia del cultivo solo en la zona de Leones y Guatimozín, encontrándose esos lotes en pleno llenado de capítulo luego de haber sido alcanzados por fuertes cuadros de estrés hídrico y térmico en enero. Se estima rendimiento de 16 qq/ha con cosecha estimada a partir del 25 de febrero.

SORGO
Se reportan muy pocos lotes, con estado avanzado en el ciclo, entre floración y grano pastoso. Al momento no se reportan condiciones ambientales negativas lo que se condice con el buen estado general que muestran los cultivos.

OTROS
Las alfalfas de la zona se encuentran en floración e intentan recuperar estado en este período.

DEPARTAMENTO ROQUE SAENZ PEÑA

Las precipitaciones acumuladas de enero rondaron los 84 mm, mientras que en febrero, hasta el 13, se sumaron como máximo otros 53 mm. (www.bccba.com.ar / Precipitaciones). Las temperaturas se normalizan en este período.

MAÍZ
La participación de maíz de 1º alcanza el 90% del total de la gramínea en el departamento. Al momento de este informe los cultivos se muestran en regular estado, en etapa de grano lechoso a grano duro. La primera estimación de rendimiento para esta campaña oscila entre 55-80 qq/ha. con variabilidad de acuerdo al grado de severidad del estrés térmico e hídrico sufrido durante diciembre y enero.
El maíz de segunda finaliza la etapa vegetativa y entra en floración con cultivos en mejor estado sin estrés de importancia. Algunos se animaron a refertilizar aprovechando bondades climáticas puntuales aplicando entre 50-60 kg/ha. de nitrógeno elemento.

SOJA
Se refuerzan controles de malezas e insectos como arañuela y orugas para los cuales se aplican herbicidas (glifosato) e insecticidas (dimetoato y clorpirifós).
La soja de primera está entre floración y llenado de vaina (R1- R5), con cultivos anteriormente muy sufridos pero ahora en mejor estado. Sin duda que las pasadas situaciones de estrés tendrán su repercusión en los rendimientos futuro. A la fecha, la primera estimación, con amplia variabilidad, arroja valores entre 10-38 qq/ha.
La soja de segunda, con los primeros lotes iniciando la floración, muestra mejor condición de cultivo.

GIRASOL
Con lotes en inicio de madurez, la cosecha comenzaría a fines de febrero. Los rendimientos podrían rondar los 23 qq/ha.

DEPARTAMENTO GENERAL ROCA

Enero cerró con aportes mensuales de precipitaciones variables entre 52-161 mm. En tanto, hasta el 13 de febrero se sumaban entre 46-114 mm. los que ofrecen un alivio a la estresante condición de enero. (www.bccba.com.ar / Precipitaciones). Las temperaturas de febrero retoman la normalidad de la estación.

MAÍZ
La participación de maíz de 1º- maíz de 2º es casi equilibrada (aproximadamente 50% de cada uno).
El maíz de primera está llenando granos (en estado lechoso), y aunque ha sido víctima de fuertes cuadros de calor y sequía, ahora se observa buen estado en los cultivos. Los rendimientos a obtener rondarían los 50-60 qq/ha.
El maíz de segunda entre 6 hojas y floración (V6-R1) está en mejor estado y con más probabilidades de mejorar en lo que queda del ciclo. Esto animó a refertilizar algunos lotes incorporando nitrógeno en niveles cercanos a los 30 kg/ha. de nitrógeno elemento.

SOJA
La soja de primera está en plena floración, mejorando en su estado tras los fuertes episodios de estrés que muchas veces desencadenaron aborto de flores. Se estiman para esta campaña rendimientos de 25-28 qq/ha.
La soja de segunda finaliza la etapa vegetativa con los primeros lotes en floración. No hay graves daños sobre estos cultivos. Por último la poca soja resembrada está un poco más atrasada en el ciclo debido a la demora de la resiembra, con lotes entre 4-5 hojas.

GIRASOL
Los cultivos están en buen estado (recuperándose de isocas medidoras) y en etapa de llenado. Los rendimientos de esta campaña rondarían los 16-20 qq/ha. y se destaca la grave pérdida de rendimiento que originan las palomas. La cosecha está prevista desde fines de febrero.

MANÍ
Los cultivos están en buen estado y en etapa de clavado. De a poco los lotes comienzan a recuperarse de los pasados cuadros de estrés. Algunos lotes se han tratado para el control de viruelas obteniéndose resultados aceptables.

SORGO
Con algo más de participación en la zona oeste del departamento (aunque igualmente es poca superficie), los cultivos se encuentran en floración sin reportar mayores problemas.

Ing. Agr. Silvina Fiant
Bolsa de Cereales de Córdoba