




... y cumplimos el primer año de reportes...

CULTIVOS DE VERANO: condición de los cultivos 2008.

Relevamiento del 21 de Febrero al 10 de Marzo de 2008.

Departamentos Tercero Arriba, General San Martín, Río Cuarto, Juárez Celman, Unión, Marcos Juárez, Roque Sáenz Peña y General Roca.

GENERALIDADES DEL PERÍODO

Caminos: Otra vez comienzan los reportes de complicaciones, así como la previsión de dificultades para trasladar la próxima cosecha debido al estado de conservación de rutas y caminos.

Combustibles: No solo se repite la dificultad de conseguir el insumo y/o de abonar un mayor costo por el mismo, sino que además ahora el impacto llegó hasta el aumento de las tarifas que establecen los contratistas de maquinarias agrícolas para la próxima cosecha.

MAÍZ DE 1º: Los rendimientos quedaron definidos. En el siguiente cuadro se muestra un resumen y comparación de los rendimientos del año anterior y este año. Además se recuerda la participación del maíz de primera en la presente campaña.

Departamento	Rto. MAÍZ de 1º 2006/07	% de superf. Maíz 1º 2007	1º Estimación de rto. MAÍZ de 1º 2007/08	2º Estimación de rto. MAÍZ de 1º 2007/08
	Rto. Promedio (julio `07)	Maíz 1º + 2º= 100%	1º estimación Febrero 2008	2º estimación Marzo 2008
Marcos Juárez	100 qq/ha.	90 %	70-100 qq/ha	82 qq/ha
Unión	100 qq/ha.	90%	75-100 qq/ha	75 qq/ha
Juárez Celman	85 qq/ha.	80%	45-80 qq/ha	56 qq/ha
Río Cuarto	80 qq/ha.	80%	40-80 qq/ha	63 qq/ha
R. Sáenz Peña	85 qq/ha.	90%	55-80 qq/ha	60-70 qq/ha
Gral. Roca	66 qq/ha	50%	50-60 qq/ha	Oeste 50- Este 100 qq/ha
Tercero Arriba	75 qq/ha	80%	40-65 qq/ha	51 qq/ha
Gral. San Martín	83 qq/ha.	80%	50-80 qq/ha	65 qq/ha

Fuente: A partir de datos recolectados por Bolsa de Cereales de Córdoba

MAÍZ DE SEGUNDA: Superado el período crítico, se perfilan los rendimientos a obtener con rangos entre 62-100 qq./ha. El menor valor reportado en el dpto. Gral. Roca y el mayor en Roque Saenz Peña.

SOJA DE 2º PERÍODO CRÍTICO. Finalizó la etapa vegetativa y se transitan los momentos decisivos para la definición de rendimientos (llenado de vainas), motivo por el cual aún no se disponen de estimaciones de rendimientos. El estado de alerta para el seguimiento de plagas y enfermedades es

continuo desde la soja de primera a la de segunda. También en este período, a veces las condiciones ambientales determinan cierto riesgo para instalación de enfermedades de fin de ciclo.

Departamento	SOJA de 1° 2006/07	SOJA de 1° 2007/08	SOJA de 1° 2007/08
	Rto promedio 2007	1° estimación febrero 2008	2° estimación marzo 2008
Marcos Juárez	32-38 qq/ha	25-35 qq/ha	32 qq/ha
Unión	38 qq/ha	20-35 qq/ha	30 qq/ha
Juárez Celman	35 qq/ha	25-40 qq/ha	30 qq/ha
Río Cuarto	35 qq/ha	20-30 qq/ha	26 qq/ha
Roque Sáenz Peña	32 qq/ha	10-38 qq/ha	18-35 qq/ha
General Roca	32 qq/ha	25-28 qq/ha	28 qq/ha
Tercero Arriba	30 qq/ha	20 qq/ha	23 qq/ha
General San Martín	31 qq/ha	15-30 qq/ha	28 qq/ha

Fuente: A partir de datos recolectados por Bolsa de Cereales de Córdoba

GIRASOL:

Con la cosecha a pleno, se confirman las proyecciones. Este año ha sido muy bueno para la oleaginosa en nuestra provincia, y entre los departamentos relevados en este informe, General Roca es el de los mayores rendimientos señalados (26 qq./ha. en promedio).

Las imágenes de este período.....



Soja de segunda en pleno ataque. Marzo de 2008
Fuente Bolsa de Cereales de Córdoba



Sorgo llenando grano. Marzo 2008
Fuente Bolsa de Cereales de Córdoba



Primeras sojas en cosecha. Marzo 2008
Fuente Bolsa de Cereales de Córdoba



Maíz deformado por carbón. Marzo 2008
Fuente Bolsa de Cereales de Córdoba

DEPARTAMENTO TERCERO ARRIBA

Las precipitaciones tuvieron un comportamiento variable dentro de este departamento, con valores entre 50 mm. y 136. mm registrados en el mes de febrero y otros 30-54 mm. del 1 al 12 de marzo. Algunas granizadas en este último período alcanzaron las zonas de Almafuerte, Corralito y Tancacha, con daños de intensidad variable en Soja, Girasol y Maíz.

MAÍZ

Los maíces de primera permanecen en estado regular, y por estos días ya están en Madurez Fisiológica, perdiendo humedad para poder ser cosechados a partir del 20 de marzo. Una segunda estimación de rendimiento, va cerrando la brecha de la anterior, con promedios cercanos a los 51 qq./ha.

Los maíces de segunda y los pocos sembrados muestran más amplitud en estadíos fenológicos, con lotes en floración y otros ya en llenado de grano. La condición de estos cultivos es buena en comparación con los de primera a pesar de algunos ataques de orugas cogolleras y heliotis zea. Los rendimientos podrían ubicarse más cercanos a los 70 qq./ha. pero falta mucho del ciclo por transitar. La cosecha podría tener lugar entre junio y agosto.

SOJA

La soja de primera, en estado regular a bueno, transitan las últimas etapas del ciclo, con lotes que están entre llenado de vainas y madurez fisiológica. Una actualizada estimación de rendimientos, eleva el anterior valor a 23 qq/ha (3 qq/ha más que en la estimación de febrero). La cosecha podría tener lugar a partir del 20 de marzo, conjuntamente con el maíz de primera.

La soja de segunda, está entre plena floración e inicio de llenado de vaina, con cultivos en estado bueno a muy bueno pese al nuevo estrés hídrico de algunos lotes y los ataques de orugas y chinches de otros. Se han aplicado los correspondientes insecticidas y hasta el momento se reporta baja incidencia de enfermedades.

La soja de resiembra está en estado y avance parecida a la de segunda.

GIRASOL

El ciclo finalizó con cultivos en estado bueno a regular. Ahora la cosecha está iniciada en el departamento, aunque serían pocos los lotes implantados. Los rendimientos informados en este momento oscilan los 19 qq./ha.

MANÍ

Los cultivos se encuentran en buen estado, en etapa de clavado y llenado de cajas. En este período, algunos lotes han sufrido algún grado de estrés hídrico. Las endémicas viruelas han sido tratadas con 2-3 aplicaciones de fungicidas y con buena efectividad en los tratamientos. Entre las plagas, continúa reportándose presencia de arañuela.

SORGO

Los cultivos se encuentran entre llenado de grano y Madurez fisiológica, aunque la cosecha se estima desde el 20 de marzo y hasta junio. Los rendimientos estimados estarían cerca de los 60 qq./ha.

DEPARTAMENTO GENERAL SAN MARTÍN

Las temperaturas y precipitaciones recuperan la normalidad en este período, acumulándose en el mes de febrero entre 40 y 128 mm. y en marzo (hasta el 12) otros 15-43 mm . (www.bccba.com.ar/ Precipitaciones).

MAÍZ

El maíz de primera reporta condición regular a buena. Los lotes se encuentran ya en madurez fisiológica, esperando perder humedad para poder ser cosechados a partir de la segunda mitad de marzo. Los rendimientos lograrían promedios de 65 qq./ha., excluyendo a la zona de Silvio Péllico que lograría menores valores, en torno a los 35 qq/ha. También en la zona de Villa María, se informa que varios lotes han sido picados para uso forrajero.

El maíz de segunda está entre floración y llenado de granos, con algunos lotes ya en madurez fisiológica. La condición de estos cultivos es mejor que la de los sembrados en fechas de primera, con lo cual alcanzarían rendimientos cercanos a los 70-75 qq./ha. Hubo lotes con ataques de orugas cogolleras, isocas de la espiga y entre las enfermedades se observa presencia de carbón. La cosecha está prevista a partir de abril y hasta agosto.

SOJA

La soja de primera está finalizando el ciclo (Fin llenado de vaina a madurez fisiológica) con gran variedad en la condición de los cultivos (de regulares a muy buenas). La cosecha podría tener lugar desde mediados de marzo, con rendimientos promedios cercanos a los 28 qq./ha. excluyendo otra vez a la zona de Silvio Péllico, de menor potencial, que solo lograría unos 15 qq./ha. de rendimiento.

La soja de segunda y la resembrada a último momento están entre floración e inicio de llenado de vainas, con cultivos en estado general bueno a muy bueno. Los rendimientos a obtener podrían estar en torno a los 30 qq./ha. Entre los últimos daños, se menciona la aparición de enfermedades como septoria y mancha púrpura en niveles tolerables, e insectos como isocas, tucuras y chinches a los cuales se han aplicado los correspondientes insecticidas.

GIRASOL

La cosecha está en marcha, con avance cercano al 50% del total implantado. Los rendimientos informados como promedio al momento se acercan a los 21 qq./ha.

MANÍ

Los cultivos están en plena etapa reproductiva, entre clavado y llenado de cajas. La condición de los cultivos es buena, pese a la presencia de arañuela y tucuras (estas últimas más aisladas). En cuanto a enfermedades, ya se han realizado entre 2 y 3 controles para las viruelas con buena efectividad. Con gran preocupación se reportan algunos casos de esclerotinia en lotes con antecesor soja.

SORGO

Los cultivos se encuentran entre llenado de grano y madurez fisiológica. Los más atrasados están recién en floración. Con amplia variabilidad, la cosecha de este año se haría entre fin de marzo y fin de mayo. Los rendimientos oscilarían los 55-60 qq./ha.

DEPARTAMENTO RÍO CUARTO

Este período se caracterizó por temperaturas normales. En cuanto a lluvias, en todo febrero se acumularon de 21-176 mm. de precipitaciones, mientras que en marzo, hasta el 12 se sumaron otros 17-47 mm. (www.bccba.com.ar/ Precipitaciones).

MAÍZ

El maíz de primera está llegando a madurez fisiológica, y entre las últimas complicaciones se reportan daños por carbón y mal de río cuarto. La cosecha tendría lugar justo después de la trilla de soja, hacia fines de marzo y mediados de abril. Se esperan rendimientos que promediarían ahora unos 63 qq./ha. y se recuerda el desvío a uso forrajero de varios lotes dentro de este departamento.

El maíz de segunda y aquellos resebrados a último momento están entre floración y llenado de grano. La condición de estos cultivos es muy buena, diferenciándose en este aspecto de las fechas de primera (solo se reportan unos pocos casos de royas). Podrían obtenerse mejores rendimientos, cercanos a los 80 qq./ha. pero la cosecha sería a partir de junio.

SOJA

La soja de primera está llegando a madurez fisiológica con cultivos en estado general bueno. La cosecha ha iniciado en algunos lotes aislados, previéndose inicio formal para mediados de marzo. Los rendimientos, algo más parejos en esta estimación, podrían promediar los 26 qq./ha.

La soja de segunda, está entre floración y llenado de vainas. La condición de cultivo va de buena a muy buena dentro del departamento pese a los ataques de isocas, chinche y otras plagas. Aunque la presencia de enfermedades no es despreciable, se han realizado pocos tratamientos preventivos para enfermedades de fin de ciclo.

Algo más atrasada, la soja resebrada, está en floración, en buen estado general.

GIRASOL

La cosecha está a pleno. Los rendimientos en este buen año para la oleaginosa van cerrando en torno a los 25 qq./ha. en promedio.

MANÍ

Los lotes del departamento están en etapa de llenado de cajas. El estado general es bueno, y aunque no se reportan nuevas plagas en este período, las enfermedades adquieren protagonismo. Las viruelas son controladas con 2 aplicaciones de fungicidas, mientras que aparecen casos aislados de esclerotinia de difícil control.

SORGO

Los lotes continúan en llenado de granos acercándose a la madurez fisiológica en buenas condiciones generales. La cosecha iniciaría a fines de marzo, y se esperan rendimientos promedios cercanos a los 70 qq./ha.

DEPARTAMENTO JUÁREZ CELMAN

Las lluvias aportaron de 21-130 mm. en el mes de febrero y otros 21-115 mm. en marzo, hasta el 12 (www.bccba.com.ar/ Precipitaciones). Las temperaturas se reportan normales a frescas.

MAÍZ

El maíz de primera está en madurez fisiológica, por lo cual es factible observar avance de cosecha de acuerdo a la pérdida de humedad de las espigas. El rendimiento promedio reportado en este período se acerca a lo 56 qq./ha, ya que se incorporan al cálculo muy bajos valores de 20-30-40 qq./ha. El comienzo generalizado de la cosecha está previsto para mediados de marzo.

El maíz de segunda está de floración en adelante. La condición de estos cultivos es mucho mejor a la de siembras de primera (solo se mencionan unos pocos casos de roya), y una primera estimación de rindes oscila en los 80 qq./ha. La cosecha recién tendría lugar a partir de junio.

SOJA

La soja de primera está en madurez fisiológica, con cosecha a partir de mediados de marzo. La condición de cultivo, recuperada en parte, permitiría alcanzar rendimientos promedios cercanos a los 30 qq./ha. excluyendo casos aislados que solo reportan 10 qq./ha. debido a la sucesión de condiciones ambientales negativas acumuladas durante todo el ciclo (algunos lotes de la zona de La Carlota).

La soja de segunda está en el período crítico de llenado de vainas con cultivos en general en buen estado. Algunos lotes en la zona de Gral. Deheza y Gral. Cabrera aún sufren déficit hídrico en este momento.

Por último, la poca soja resemebrada hasta enero está entre floración y comienzo de llenado de vainas, en estado general bueno.

Entre las plagas de la soja de segunda y de la resemebrada, se mencionan por estos días la aparición de chinches y orugas medidoras a las que se está controlando químicamente. Entre las enfermedades, solo se reportan casos de bacteriosis hasta el momento.

MANÍ

Los cultivos están llenando caja, en la etapa final del ciclo. El arrancado de los primeros lotes sería desde mediados de marzo. El estado general es bueno, se reporta presencia de arañuelas y entre las enfermedades continúan las aplicaciones para control de viruelas. Con preocupación se informa la presencia de esclerotinia en algunos lotes.

SORGO

Los cultivos se encuentran en estado de grano pastoso, en buen estado general. El período de cosecha sería prolongado, desde el 20 de marzo a fines de abril, y los rendimientos podrían rondar los 65 qq./ha. en esta campaña.

DEPARTAMENTO UNIÓN

Al finalizar febrero se acumularon de 116 a 188 mm. de precipitaciones, mientras que hasta el 12 de marzo se sumaban otros 15-45 mm (www.bccba.com.ar/ Precipitaciones).

Con esto, y las temperaturas, en este período se reporta cierta normalidad en las condiciones meteorológicas.

En contraposición al ambiente, se menciona la dificultad que ya se está sufriendo para el aprovisionamiento de combustibles. Vuelven a mencionarse problemas con algunas rutas, entre las que se destaca la provincial N° 3 en cercanías de Monte Maíz.

MAÍZ

El ciclo finaliza en los maíces de primera que ya se encuentran en madurez fisiológica, en descenso de humedad para la incipiente cosecha. Los rendimientos promediarían los 75 qq./ha., aunque con una gran amplitud entre los datos individuales (mínimos- máximos de 40- 100 qq./ha. respectivamente). La cosecha está a pleno en el departamento.

En cuanto al maíz de segunda, la floración ha finalizado y el ciclo progresa con cultivos en buen estado que se cosecharían no antes de junio.

SOJA

La soja de primera cierra su ciclo, con cosechas programadas desde 10 de marzo en adelante. Los rendimientos promediarían ahora los 30 qq./ha.

La soja de segunda y la poca de resiembra están en este período entre floración y llenado de vaina (R1-R5), con buen estado general en los lotes, aunque también con pérdidas de rendimiento a causa de las pasadas sequías o debido disminución en el estand de plantas por acción de orugas desfoliadoras. Otros insectos presentes en este período son chinches a las que se controla químicamente.

GIRASOL

Los pocos lotes del departamento ya registran un importante avance de cosecha, entre 30-60%. En cuanto a los rendimientos, los promedios ahora arrojan valores de 21 qq./ha., algo menos que la anterior estimación de precosecha.

SORGO

Los cultivos cierran el ciclo en buenas condiciones. La cosecha iniciaría el 20 de marzo y los rendimientos estimados recientemente se mantendrían en 60 qq./ha. como en el anterior informe de febrero.

OTROS

La Alfalfa nueva se sembraría desde la primera quincena de marzo. Las de años anteriores están en recuperación.

En la zona de Idiazabal se reporta una pequeña superficie destinada a Maíz Pisingallo, cuya cosecha está planeada para mediados de marzo y el rendimiento a obtener podría ser de 40 qq./ha.

DEPARTAMENTO MARCOS JUÁREZ

El mes de febrero finalizó aportando al departamento entre 97- 125 mm. de precipitaciones, mientras que la primera quincena de marzo, hasta el 12, sumaban otros 23-45 mm. (www.bccbba.com.ar/Precipitaciones). Las temperaturas se reportan normales para la época, y las precipitaciones demuestran ciertos excesos en algunas zonas del departamento.

MAÍZ

El maíz de primera está listo para cosecharse, solo resta que disminuya la humedad. El avance reportado corresponde a los lotes más adelantados, los cuales totalizan un 10% de superficie en trilla en este período. El promedio de rendimientos está en 82 qq./ha. pero es destacable mencionar las diferencias que integran este promedio, ya que al norte de Leones los valores oscilan 80-100 qq./ha. mientras que al sur de la misma localidad alcanzan solo 50-70 qq./ha.

El maíz de segunda finaliza la floración y comienza el llenado de granos en este período. El estado de estos cultivos está entre bueno y muy bueno, aunque falta bastante aún para la cosecha que tendría lugar a partir de fines de mayo. Los rendimientos podrían rondar los 83 qq./ha.

SOJA

La soja de primera finalizó el llenado y se encuentra en madurez fisiológica. La cosecha arrancó el 10 de marzo y los rendimientos estimados en este momento promedian los 32 qq./ha. en el departamento.

La soja de segunda está entre plena floración y comienzo de llenado de vaina con lotes en buena condición general. Se mencionan en este período ataques de chinche a las cuales se controla químicamente. En cuanto a enfermedades aparecen las enfermedades de fin de ciclo para las cuales también se realizan los tratamientos de control y/o prevención.

Solo en la zona de Guatimozín y en Leones se reporta algo de resiembra debido a granizadas tempranas. Estos lotes son los más atrasados y están en inicio de floración.

GIRASOL

La cosecha inició los primeros días del mes de marzo. Los rendimientos estimados ahora tienen una mejoría respecto a los de febrero ya que se esperan unos 21 qq./ha. en promedio (febrero 16 qq./ha.). No debe dejarse de recordar que es mínima la superficie de la oleaginoso en este departamento.

SORGO

Los cultivos están acercándose a madurez fisiológica con lotes en buen estado. La cosecha tendría lugar desde fines de marzo, y los rendimientos estimados promediarían los 70 qq./ha., excepto en la zona de Inrville en dónde sólo se lograrían unos 40 qq./ha. en algunos lotes de la zona de Guatimozín se reporta aparición de pulgón y mosquita del sorgo.

DEPARTAMENTO ROQUE SÁENZ PEÑA

Finalmente febrero cerró con precipitaciones cercanas a los 158 mm mensuales, en tanto que marzo aporta hasta el 12 otros 21 mm. más (www.bccba.com.ar/ Precipitaciones).

En cuanto a las temperaturas, las mismas se reportan como normales en este período.

MAÍZ

El maíz de primera está en estado regular, y aunque aún no llega a madurez fisiológica, los rendimientos estimados se ajustan a unos 60-70 qq./ha. La cosecha está prevista desde el 1° de abril.

El maíz de segunda, está entrando a las etapas reproductivas de floración. El estado general de estos lotes es muy superior a las siembras de primera, con lo cual los rendimientos podrían alcanzar los 90-100 qq./ha. Sólo en algunos lotes se reporta presencia de royas. La cosecha, recién iniciaría en junio.

SOJA

La soja de primera está finalizando el llenado de vainas. En cuanto a condición de cultivos hay amplia variabilidad (de regulares a muy buenos). Entre los daños reportados se mencionan al final del ciclo ataques de medidoras, chinches y arañuela controladas efectivamente. Siguiendo idéntica variabilidad, los rendimientos a obtener en este año estarían entre 18-35 qq./ha. La cosecha está prevista desde mediados de marzo.

La soja de segunda, está en inicio de llenado de vainas (R3), en estado general bueno pese a los recientes ataques de medidoras.

GIRASOL

La cosecha está a pleno. Los rendimientos se mantienen en promedios de 23 qq./ha.

DEPARTAMENTO GENERAL ROCA

En febrero los aportes de precipitaciones totalizaron entre 133-157 mm., mientras que en marzo, hasta el 12 se sumaron otros 24 mm. más. (www.bccba.com.ar/ Precipitaciones). Las temperaturas se reportan de normales a frescas para la época.

MAÍZ

El maíz de primera está en madurez fisiológica, resta que pierda humedad para poder cosecharse, tarea que está prevista a partir del 20 de marzo. En cuanto a los rendimientos hay una clara diferencia entre los pobres valores del oeste y sur departamental, alcanzando sólo 30-50 qq./ha. En tanto la zona este, reporta mejor condición y valores cercanos a los 100 qq./ha.

El maíz de segunda, está en llenado de grano, en estado general bueno, con algunos reportes de carbón. Los rendimientos a obtener promediarían los 62 qq./ha.

SOJA

La soja de primera está finalizando el llenado de vainas, con cultivos en estado entre regular y muy buenos. La cosecha arrancaría en el mes de abril, y se mantiene la estimación de rendimientos 28 qq./ha.

La soja de segunda, avanza entre floración y llenado de vainas. El estado de los cultivos va de muy bueno a regular. Entre los daños más reciente se menciona la acción de arañuelas y orugas.

GIRASOL

La cosecha registra un avance superior al 40% de avance en este período. Los rendimientos ahora mejoran la anterior estimación, promediando 26 qq./ha. (antes 16-20 qq./ha.).

MANÍ

Los cultivos están llenando cajas y largando nuevos clavos, en estado general bueno. Los daños mencionados en este período son los ocasionados por arañuelas, a las que se aplica insecticidas para su control. Entre las enfermedades, ya se han realizado entre 2-3 aplicación para prevención y/o control de viruelas.

SORGO

La mayor parte de los lotes es de uso forrajero, por lo cual no se dispone de datos en cuanto a producción de granos.

*Ing. Agr. Silvina E. Fiant.
Bolsa y Cámara de Cereales de Córdoba*