



 **NewsAgro Argentina**

Evolución de la Campaña Agrícola

Disparidad en los Rindes de Granos Cordobeses

Las estimaciones oficiales de producción nacional para 2005/06 hablan de una campaña triguera de 12 M/t, una reducción del 26% con respecto al período anterior. La cosecha de soja promete ser superior a la de 2004, y con bajas para maíz y girasol, que los analistas no terminan de determinar en cuanto será inferior. La consultora NewsAgro elaboró este informe especial sobre la evolución de la cosecha y siembra de gruesa en Córdoba.

Que pasa en Córdoba

En el norte de Córdoba el balance post cosecha del cereal de invierno dejó claro que ocurrieron importantes reducciones de rendimiento. El principal factor que jugó en contra fue la falta de humedad en el suelo, producto de escasas lluvias en forma prolongada durante todo el ciclo fisiológico del cultivo.

Analizando algunas cifras provinciales, en conjunto los departamentos de Río Seco, Tulumba y Colón no superaron los 10 qq/ha de promedio de rendimiento. Contrariamente, la región que abarca el norte de San José de La Dormida y otra desde San Francisco hasta Monteros, tuvieron productividades superiores al año pasado y aún menores a los previsto, respectivamente.

En el este cordobés, el departamento Unión rindió 18 a 19 qq /ha, con una significativa pérdida de hectáreas cosechables por la ocurrencia de heladas tempranas. Al Sur provincial le fue algo mejor: en el corredor Laboulaye – Rufino se obtuvieron 33-34 qq/ha. Pero en la localidad de Serrano y hasta Bouchard, el promedio nuevamente se reduce a menos de 20 qq por hectárea.

Cabe destacar que existió una gran cantidad de lotes que no fueron cosechados y que se destinaron al consumo animal directo, o fueron desecadas directamente para adelantar la siembra de otros granos.

Como viene la soja

Esta semana, la siembra de la oleaginosa alcanzó cerca de 90% sobre 15.620.000 hectáreas que serían las totales implantadas, un 6.5 % más que en 2004. **La expansión de las siembras de segunda ocupación en el este de Córdoba**, sur de Santa Fe y norte de Buenos Aires y un moderado avance de las coberturas de las provincias nortenas posibilitó que se concretara la implantación en 13.5 millones de hectáreas.

Las lluvias de la Navidad apoyaron el final de las siembras en el norte de Córdoba, en crecimiento respecto del año agrícola anterior. En cambio la humedad sigue siendo insuficiente en la región occidental pampeana, mientras que hay suelos debilitados con muy poca humedad superficial en el centro sur de Córdoba. Esto dificulta la implantación de las sojas más tardías e incluso las de segunda.

En cuanto a la condición de los cultivos **es buena en la zona lidera del este de Córdoba**, desarrollándose en estados vegetativos, de siete a ocho hojas, con los cuadros más adelantados en etapas reproductivas. En el sur de Córdoba los cultivos están más complicados dominando cuadros de escaso desarrollo vegetativo y porte.

¿Y la gruesa como viene?

A nivel país, para tener una idea, se implanto cerca del 90 % de la superficie destinada a la producción de maíz comercial. Esto representa en números cerca de 2.000.000 de hectáreas, de las 2.23 millones destinadas a este propósito. Las precipitaciones endentecen el avance de la siembra, obviamente en las provincias nortenas pero a la vez aseguran la posibilidad de concretar las

implantaciones pendientes, considerando que **las lluvias favorecerán la finalización de las coberturas tardías en el norte de Córdoba.**

La demora en estas regiones ocasiona el retraso que se verifica en esta época, del 6,5% respecto de 2004. **La condición de los lotes es buena todavía en el este de Córdoba**, pero comienzan a transitar los inicios o la plena floración con ciertas limitantes de humedad y se teme que de no producir nuevas recargas, el agua acumulada no pueda sustentar a esta fase eficientemente y en consecuencia afecte la potencialidad productiva.

En el sur de Córdoba hay ya cultivos con algunos casos en procesos de formación y llenado de granos, donde la falta de humedad va a ser determinante de granos vacíos o poco llenos, y bajos rendimientos. De todos modos, hay pronósticos de la Oficina Nacional Oceanográfica de EEUU, los más exactos a nivel determinación de precipitaciones en el mundo, **que indican algo de alivio en el sur de Córdoba, para lo que resta de Diciembre.**

Qué te pasa, girasol....

Continúa demorada la siembra local, aunque ya esta semana se completó el 98 % del total proyectado estimado en 2.200.000 hectáreas. **La falta de humedad suficiente en Córdoba recortó plantíos**, que con escaso desarrollo foliar y altura comienzan la formación del botón floral.

Autor: Consultora NewsAgro www.newsagro.com.ar

Fuente: datos propios y en base a Bolsa de Cereales