



06/01/2004

INFORME CLIMÁTICO Y DEL ESTADO DE LOS CULTIVOS PARA LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS

Elaborado por Bolsa de Cereales de Entre Ríos (BCER) y Consultora de Climatología Aplicada (CCA)


Luego de las copiosas lluvias del 26 y 27 de diciembre, la provisión de agua se vio retraída fundamentalmente por el progreso de aire frío y seco que se posicionó sobre el territorio provincial hasta el día jueves inclusive.

A partir de entonces la recomposición de la circulación del norte impuso rápidamente el aire proveniente de los trópicos y de este modo el domingo 04/01, pudieron observarse sectores donde se desarrollaron tormentas que se desplegaron dentro de una escala zonal.

La zona más favorecida es la ubicada hacia el noroeste del departamento Nogoyá, donde en algunos casos los registros alcanzaron los 80 mm. Esta tormenta se desintegró en su trayectoria hacia el noreste y las lluvias perdieron intensidad. Sólo se han reportado otros registros significativos hacia el centro del departamento de Federal.

Como es elocuente en el mapa, el resto de la provincia recibió precipitaciones muy escasas y en muchos sectores nulas.

Una tendencia inicial para el comportamiento de las lluvias del resto del mes, marca una conducta normal o levemente por encima de lo esperado. Sin embargo, el carácter irregular en la distribución de las lluvias provocadas por las tormentas de verano puede generar mosaicos donde las precipitaciones pueden ser temporalmente deficientes.



INFORME CLIMÁTICO Y DEL ESTADO DE LOS CULTIVOS
PARA LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS


Elaborado por Bolsa de Cereales de Entre Ríos (BCER) y Consultora de Climatología Aplicada (CCA)

A tono con el mapa de precipitaciones, el nivel de los almacenajes ha decaído en gran parte de la provincia, salvo en el departamento Victoria y el departamento Nagoya, donde se mantuvieron o fueron incrementados. A pesar de que las temperaturas inferiores a las normales jugaron a favor de la conservación de humedad, la fuerte insolación y el viento hicieron un trabajo opuesto.

Durante el viernes y el sábado la evapotranspiración fue muy fuerte y consecuentemente el balance aceleró su comportamiento deficitario. Sin embargo puede considerarse que el estado general de las reservas es aceptable, salvo sectores aislados principalmente hacia Concordia.

El actual estado del maíz, con una fuerte demanda hídrica, queda bien representado en este mapa donde se simula una pradera permanente y las buenas posibilidades de que se produzcan lluvias adecuadas permite augurar una buena evolución de este cultivo, siempre dentro de las consideraciones hechas sobre las lluvias de verano.

Recurriendo a la estadística de los últimos 30 años, el territorio provincial deberá recibir lluvias de entre 125mm y 145mm. Generalmente los acumulados más importantes de este mes se ubican hacia el nordeste de la provincia.



INFORME CLIMÁTICO Y DEL ESTADO DE LOS CULTIVOS PARA LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS

Elaborado por Bolsa de Cereales de Entre Ríos (BCER) y Consultora de Climatología Aplicada (CCA)

ESTADO DE LOS CULTIVOS AL 6 DE ENERO

Las precipitaciones registradas en el territorio provincial durante el domingo 4 fueron muy dispares, no sólo en intensidad sino en cantidad de lluvia caída. Los mayores milimetrajes fueron reportados del noroeste del departamento Nogoyá, mientras que en otras zonas fueron sólo una llovizna o nulas.

A pesar de las escasas precipitaciones en la mayor parte de la geografía entrerriana, las reservas hídricas son adecuadas, por lo que, los cultivos de gruesa continúan evolucionan satisfactoriamente, y manifestando en general una muy buena sanidad.

MAÍZ

Los lotes de maíz continúan el llenado de granos, favorecidos por temperaturas óptimas y una adecuada humedad edáfica. Se estima que a partir de la segunda quincena de enero se iniciaría la cosecha de los maíces más precoces; aunque la recolección de granos se intensificaría después del 15 de febrero.

GIRASOL

En los próximos 10 a 15 días daría comienzo la cosecha de los lotes sembrados a fines de agosto; el resto continúa con el llenado de los granos, conservando una excelente sanidad, por lo que los productores poseen muy buenas expectativas en cuanto a los rendimientos a obtener en los girasoles sembrados en fecha óptima.

ARROZ

Los Ingenieros del sector arrocerero comunicaron que aproximadamente en 5 días iniciarían la etapa de panojamiento los primeros lotes sembrados. Habiéndose normalizado las temperaturas mínimas, sería perentorio la ocurrencia de días de buena radiación para la obtención de buenos rendimientos.

SORGO

Los primeros sorgos sembrados comenzaron la etapa de floración, observándose en la mayoría de los lotes un buen número de panojas por metro cuadrado. El resto de los lotes se encuentra en el período vegetativo, presentando hasta el momento una excelente sanidad.

SOJA

Dentro del territorio provincial el estado sanitario del cultivo es bueno; sin embargo, los Ingenieros Informantes han detectado la presencia de diversas enfermedades que han producido la muerte de algunas plantas. Es importante destacar la gran adaptabilidad que presenta la soja para mantener muy buenos rendimientos, (aunque presente una disminución en el número de plantas por metro cuadrado), debido a que es capaz de compensarlo mediante el incremento del número de chauchas por planta, o bien, aumentando el número de granos o el peso de los mismos.

Aproximadamente el 25% de los lotes se encuentra dentro del período reproductivo R1 a R5, contando con adecuados contenidos hídricos dentro del perfil del suelo y manteniéndose hasta el momento libre del ataque de insectos.

GRANIZO

Las precipitaciones del domingo 4 estuvieron acompañadas de granizo en las cercanías de Viale, Crespo y Chajarí; el evento fue de muy escasa duración e intensidad, no ocasionando daños de importancia en los cultivos implantados.

Bolsa de Cereales de Entre Ríos

bolsacer@arnet.com.ar

Lic. José Pérez

Consultora de Climatología Aplicada (CCA)