

Sin pérdidas significativas de superficie, continúan su desarrollo los cultivos invernales


Informe especial de cultivos n° 103. Septiembre 2016

Síntesis. Trigo: Para la primera quincena de septiembre de 2016, se han perdido el 4% de las 1,2 millones hectáreas sembradas. En cuanto al estado fenológico del cultivo, el 50% se encuentra en "Elongación del tallo" mientras que el 50% permanece en distintas etapas del estadio de macollaje. **Garbanzo:** Las 38.700 has. sembradas fueron inoculadas, mientras que sólo el 33% (12.800 has.) fueron fertilizadas con otros minerales. Las heladas ocurridas entre los días 3 y 5 de septiembre, tendrían impacto negativo sobre la primera camada de floración.

Trigo

Hasta la primera quincena de septiembre de 2016, se han perdido el 4% de las 1,2 millones hectáreas sembradas con el cultivo, por situaciones de anegamiento en los lotes.

En cuanto al estado fenológico del cultivo, el 50% se encuentra en "Elongación del tallo" mientras que el 50% permanece en distintas etapas del estadio de macollaje. Sanitariamente, con excepción de Gral. Roca, San Alberto y San Javier, todos los departamentos presentan enfermedades foliares como Mancha Amarilla (*Drechslera tritici repentis*) y Roya (*Puccinia striiformis* y *P. recondita*) y presencia de insectos como Pulgones (*Schizaphis graminum*), Arañuelas (*Penthaleus major*) y Trips (*Frankliniella frumenti*).




Fuente: Departamento de Información Agroeconómica- Bolsa de Cereales de Córdoba



Fuente: Adaptado de Zadoks, Chang y Konzak, 1974.

ESTADO SANITARIO DEL CULTIVO DE TRIGO Campaña 2016/17



Fuente: Departamento de Información Agroeconómica-Bolsa de Cereales de Córdoba


Garbanzo

De las 38.700 hectáreas sembradas para ésta campaña, el 100% se inoculó a la siembra con bacterias fijadoras para proveer nitrógeno a la planta simbiosis mediante. Para el resto de los elementos minerales, sólo el 33% (12.800 has.) de la superficie fue fertilizada.


Las heladas ocurridas entre los días 3 y 5 de septiembre tuvieron un impacto negativo sobre el cultivo produciendo aborto de botones florales. Pese a esto, la segunda floración a la que se considera altamente productiva, podría compensar parte de los daños por heladas.

Actualmente, el 78% del cultivo se encuentra en "Inicio de floración, primera flor abierta en la planta", mientras que el porcentaje restante se encuentra en estadios anteriores, con desarrollo de hojas ("Vn- 4 ó más hojas multifoliadas desplegadas del tallo principal" y "V3- 3° hoja multifoliada desplegada del tallo principal").

Estado fenológico del Garbanzo Campaña 2016/17-Septiembre



Fuente: Departamento de Información Agroeconómica- Bolsa de Cereales de Córdoba




Fuente: Adaptado de Chickpea Crop Production Manual

Contexto climático

Las heladas en ésta época son aún habituales. La provincia registra fecha media de última helada el 11 de septiembre en la mayor parte de su territorio.

Temperaturas bajo cero en Córdoba



3 de septiembre

4 de septiembre

5 de septiembre

Las heladas en esta época son aún habituales, teniendo la provincia como fecha media de última helada hasta el 11 de septiembre.

clima.bccba.com.ar

El presente informe fue desarrollado gracias a la participación de Colaboradores referentes en toda la provincia, que aportaron sus datos zonales durante el relevamiento realizado por la Bolsa de Cereales de Córdoba en la primera quincena de Septiembre de 2016

Permitida la reproducción total o parcial del presente informe citando la fuente.

DPTO. INFORMACIÓN AGROECONÓMICA



www.bccba.com.ar

54 351 4229637 - 4253716 Av. Francisco Ortiz de Ocampo 317. B° Gral. Paz
X5000FND Córdoba, Argentina. GPS: S 31.41414487° O 64.173740°